DOI: <https://doi.org/10.32345/2664-4738.1-2.2018.08>
 УДК: 616.366-089.87-072.1-089.168.1:615.212.032.38

ВИКОРИСТАННЯ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНОГО ВВЕДЕННЯ БУПІВАКАЇНУ В ЗНЕБОЛЕННІ ХВОРИХ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ

¹Глумчер Ф.С., ²Солярик С.О., ¹Олійник О.В., ¹Колосович А.І.

¹Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна

²Київська міська клінічна лікарня № 4, Київ, Україна
 kolosovich_igor@ukr.net

Актуальність. Останнім часом, при деяких малоінвазивних гінекологічних втручаннях, в якості компонента післяопераційного мультимодального знеболення почали використовувати внутрішньоочеревинне введення місцевих анестетиків.

Метою даної роботи було вивчення ефективності бупівакаїну при внутрішньоочеревинному введенні для знеболення пацієнтів після лапароскопічної холецистектомії.

Матеріали та методи. Обстежено 28 пацієнтів у віці від 32 до 60 років (16 жінок та 12 чоловіків), яким проводили лапароскопічну холецистектомію з приводу гострого калькульозного холециститу. Хворих було поділено на дві рівні за кількістю групи. У першій групі для знеболювання після операції використовували кеторолаку трометамін по 0,2 мг/кг внутрішньом'язово через кожних 6 годин. Якщо хворий скаржився на післяопераційний біль, який за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) оцінювалася в 7 і більше балів, застосовували фентаніл, який вводили внутрішньом'язово в дозі 0,003 мкг/кг. У другій групі, окрім компонентів мультимодального знеболення, які застосовували в першій, в кінці оперативного втручання в дренажні трубки вводили 40 мл 0,125% розчину бупівакаїну (50 мг). Введення повторювали протягом першої доби через кожних 6 годин. Стан хворих оцінювали за ВАШ через 1, 4, 8, 12 і 24 години після закінчення операції. Також визначали середню кількість фентанілу в мкг/кг, яка була використана для знеболення одного пацієнта.

Результати. Ми отримали достовірне зниження показників оцінки болю за ВАШ у пацієнтів, яким в якості компоненту мультимодального знеболення використовували бупівакаїн. Через годину після закінчення операції показник оцінки болю за ВАШ був меншим від відповідного в контрольній групі в 1,77 рази, через 4 години – в 1,47, а через 8 – в 1,55 рази. В усіх випадках $P < 0,001$. Середня доза використаного для знеболення фентанілу в дослідницькій групі була достовірно в 1,55 рази меншою від такої в контрольній групі. Суттєвих ускладнень в обох групах не було. У хворого в групі 1 спостерігалась нудота, що вимагала одноразового введення ондасетрону 2 мг.

Висновок. Внутрішньоочеревне введення бупівакаїну мало виражений знеболюючий ефект після лапароскопічних холецистектомій.

Ключові слова: післяопераційний біль, шкала ВАШ, внутрішньоочеревне введення, бупівакаїн, мультимодальне знеболення

Жовчно-кам'яна хвороба (ЖКХ) є одним з найпоширеніших захворювань людини, її частота становить серед європейського населення 10-15 %, у жителів Азії – 6-8 %, у країнах Латинської Америки – 13-35 %. Найменша захворюваність ЖКХ відзначена у корінних жителів Африки – 1 % [4]. В Україні частота ЖКХ, в залежності від регіону, становить 10-25% [1]. Характерно, що число людей, які страждають на калькульозний холецистит, у всьому світі збільшується з кожним роком, чому сприяють особливості харчування, ожиріння або надмірне схуднення, наявність цукрового діабету, спадкова схильність, малоактивний спосіб життя тощо.

Терапевтичні заходи при ЖКХ не є ефективними, не приводять до бажаного результату, тільки хірургічне втручання є оптимальним методом лікування у цієї категорії хворих. Щорічно в світі виконується близько півтора мільйона холецистектомій (ХЕ), тільки в США – 600-700 тис на рік. Пік захворюваності гострим калькульозним холециститом

припадає на працездатний вік 41-60 років, проте з кожним роком підвищується число літніх людей, що відображає загальну тенденцію в демографії [4].

На сьогоднішній день 90-95% холецистектомій проводяться лапароскопічним методом [5]. Зберігається ряд проблем під час післяопераційного ведення таких пацієнтів, зокрема, це лікування післяопераційного больового синдрому (ПБС) [5]. Навіть при неускладненому перебігу лапароскопічної холецистектомії (ЛХЕ) тривалість перебування пацієнтів у клініці визначається, насамперед, проявами ПБС. Виражений ПБС в першу добу після ЛХЕ розвивається у 14-41 % хворих, і є однією з причин тривалої втрати працездатності. Для зменшення ПБС було запропоновано багато різних методик, серед яких застосування наркотичних та ненаркотичних анальгетиків, нестероїдних протизапальних засобів, зниження тиску при проведенні пневмоперитонеуму, зменшення кількості отворів для троакарів [13].

Сьогодні для лікування ПБС використовується стратегія мультимодального знеболення, яка включає в себе використання протибольових препаратів з різними механізмами дії. Останнім часом в якості компонента такого знеболення при проведенні малоінвазивних втручань почали використовувати внутрішньочеревне введення та інфільтрацію місць проведення троакарів місцевими анестетиками [2, 8]. Цей метод був вперше застосований ще у 1951 році [10], але пізніше був несправедливо забутий протягом кількох десятиріч.

У дослідженні [8] внутрішньочеревна інстиляція бупівакаїну 0,5% 20 мл значно зменшувала післяопераційний біль після малих гінекологічних операцій. В післяопераційному періоді жодна з пацієнток не скаржилася на такі побічні ефекти місцевих анестетиків, як свербіж, седативний ефект, брадикардію, гіпотонію та тремтіння. У дослідженні, в якому взяли участь 64 пацієнти [6], стверджують, що місцеві анестетики після лапароскопічних втручань слід застосовувати тільки в першу добу після операції. У наступному періоді больовий синдром значно зменшується, тому введення цих препаратів не доцільно. Адекватне знеболення в ранньому післяопераційному періоді після ЛХЕ попереджує трансформацію больового синдрому в хронічний больовий синдром (ХБС). У дослідженні [6] вказують на формування ХБС після ЛХЕ у пацієнтів, у яких біль зберігався протягом перших днів після операції. За даними цих авторів, пасивна тактика ведення болю в цей період у 9 % пацієнтів призвела до формування хронічного больового синдрому, що тривав близько 12 місяців. Отримані нами результати підтверджують висновки про необхідність диференційованого підходу до призначення знеболюючих засобів у ранньому післяопераційному періоді після ЛХЕ [7]. При адекватному знеболенні (показники за ВАШ не перевищують 6 балів), призначення наркотичних анальгетиків має багато негативних побічних ефектів, тому недоречне.

Триває вдосконалення технології інтраперитонеального введення місцевих анестетиків. У дослідженні [3] порівнювали ефективність двох методів післяопераційного знеболювання: у пацієнтів 1-ї групи після ЛХЕ була виконана інфільтрація місць проколу черевної стінки 0,75 % розчином ропівакаїну. У пацієнтів 2-ї групи – інфільтрація області установки троакарів після закінчення операції не проводилася, а знеболювання протягом перших діб здійснювалося шляхом застосування метамізолу натрію. Автори відзначають, що результати знеболювання в групах були подібними. Так, через годину після закінчення операції вираженість ПБС у пацієнтів 1-ї та 2-ї груп, по ВАШ, склала відповідно 3,8 і 3,5 балів. При оцінці болю через 6, 12 і 24 годин значення ВАШ співвідносилися як 2,6, 1,9 і 1,3 бали в групі ропівакаїну проти 2,6, 1,8 і 1,2 балів у

групі метамізолу натрію. В жодній з груп у 24 години після операції не призначалось додаткового введення опіоїдів.

Схожі результати отримані в дослідженні [12], де одноразово для інфільтрації місць установки троакарів застосовували інстиляцію 0,5 % розчину бупівакаїну (50 мг, 0,5 % розчину розбавлені у 10 мл 0,9 % NaCl у співвідношенні 1:1) з 56 пацієнтів, які увійшли до дослідження, тільки 4 (7,1%) потребували додаткової ін'єкції опіоїдних анальгетиків. Автори стверджували, що інфільтрацію місць установки троакарів розчинами місцевого анестетика слід розглядати в якості обов'язкової процедури.

Триває удосконалення технології інтраперитонеального введення місцевого анестетика. Зокрема, йдеться про зрошення черевної порожнини розчинами місцевого анестетика в кінці ЛХЕ за допомогою спеціального пристрою, що нагадує небулайзер. Є дослідження [9], в якому 1% розчин ропівакаїну об'ємом 3,0 мл (30 мг) орошували черевну порожнину за допомогою мембранного небулайзера. Оцінювались два режими: ропівакаїн розпилювали до видалення жовчного міхура та в кінці операції після десуфляції газу. Останній метод мав значні переваги при курації хворих в постопераційному періоді.

Метою даної роботи було вивчення ефективності бупівакаїну при внутрішньочеревному введенні препарату для знеболення пацієнтів після ЛХЕ.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

На базі Київської міської клінічної лікарні № 4 було досліджено 28 пацієнтів у віці від 32 до 60 років (16 жінок, 12 чоловіків), яким проводили ЛХЕ. До проведення оперативного втручання кожного пацієнта було інформовано про ВАШ оцінки болю. На сьогоднішній день прийнято вважати, що біль трактується як низький, якщо його інтенсивність за ВАШ < 4 балів (за 10-бальною шкалою), помірний (4-7 балів) та сильний (> 7 балів) [4].

ЛХЕ у всіх обстежених хворих проводилось в умовах загальної анестезії зі штучною вентиляцією легень низькопоточною інгаляційною анестезією севофлураном напівзакритим контуром наркозною станцією *Leon Plus*. Для індукції використовували тіопентал натрію 3,0мг/кг. В якості міорелаксantu використовувався атракуріум у середній дозі 0,6 мг/кг. Для знеболення вводили фентаніл 0,0014 мкг/кг. Об'єми вентиляції встановлювалися таким чином, аби тиск вуглекислого газу в суміші, що видихується, становив 30-45 мм рт.ст. Під час лапароскопії внутрішньочеревний тиск у всіх пацієнтів підтримувався на рівні 10-12 мм рт.ст.

Хворих було поділено на дві групи: №1 (порівняння) та №2 (дослідницьку). У групі №1 для знеболювання після операції використовували кето-

ролаку трометамін по 0,2 мг/кг через кожні 6 годин внутрішньом'язово. Якщо хворий скаржився на післяопераційний біль, який за ВАШ оцінювався у 7 і більше балів, застосовували внутрішньом'язове введення фентанілу в дозі 0,003 мкг/кг. У групі №2, окрім компонентів мультимодального знеболення, що застосовували в першій групі, при закінченні оперативного втручання в дренажні трубки вводили 40 мл 0,125 % розчину бупівакаїну (50 мг). Введення повторювали протягом першої доби через кожні 6 годин. Стан хворих оцінювали за ВАШ через 1, 4, 8, 12 і 24 години після закінчення операції. Також визначали середню дозу фентанілу в мкг/кг, що була використана для знеболення одного пацієнта. Обробку отриманих результатів проводили за допомогою програми STATISTICA. Для порівняння отриманих даних використовували t критерій Стюдента.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Пацієнти обох груп достовірно не відрізнялись за віком, вагою та кількістю лікарських засобів різних груп, які було використано під час оперативних втручань (табл. 1).

Таблиця 1
Характеристика пацієнтів обох груп

Критерії	Група № 1 (n=14)	Група № 2 (n=14)
Вік, роки	62,4±8,2	65,6±6,5
Стать, ч/ж	6/8	6/8
Тривалість операції, хв	55,6±10,2	54,8±11,6
Тривалість анестезії, хв	64,8±13,5	66,9±12,4

Ми отримали достовірне зниження показників оцінки болю за ВАШ у пацієнтів, яким в якості компоненту мультимодального знеболення використовували бупівакаїн. Так, через годину після закінчення операції цей показник був меншим від відповідного в контрольній групі в 1,77 рази, через 4 години – в 1,47, а через 8 – в 1,55 рази. В усіх випадках $P < 0,001$ (табл. 2).

Крім того, середня доза використаного для знеболення фентанілу в дослідницькій групі була достовірно в 1,55 рази меншою від такої в контрольній групі (табл. 3).

Суттєвих ускладнень в обох групах не було. У хворого в групі 1 спостерігалась нудота, що вимагала одноразового введення ондасетрону 2 мг.

Таблиця 3
Середня доза використаного фентанілу (мкг/кг) в групах після лапароскопічної холецистектомії

	Середня доза використаного фентанілу (мкг/кг)
Група №1	0,0058±0,001
Група №2	0,009*±0,002

Примітка: *- достовірна зміна показника по відношенню до такого ж в групі № 1

Аналізуючи отримані дані, слід підкреслити важливість адекватного знеболення пацієнтів після ЛХЕ. Хоча больовий синдром після ЛХЕ є менш інтенсивніший і триває коротший час, в порівнянні з таким після відкритої холецистектомії, він є однією з головних причин можливих ускладнень після даного виду оперативних втручань та продовження терміну непрацездатності. Біль після лапароскопічної хірургії має два компоненти: вісцеральний та соматичний. Вісцеральний компонент найчастіше розвивається внаслідок подразнення діафрагми діоксидом вуглецю, що використовують для інсуфляції черевної порожнини. Соматичний компонент обумовлений болючістю післяопераційних ран у місцях введення троакарів. Ефективний післяопераційний контроль болю значно знижує ризик тромбозу глибоких вен та емболії легеневої артерії, підвищує здатність пацієнта глибоко дихати, що знижує можливість виникнення післяопераційних легневих ускладнень (ателектазу та пневмонії), зменшує частоту тахікардії. Післяопераційний біль може призводити до порушень метаболічних та ендокринних реакцій організму.

Описана в даній статті методика використання бупівакаїну, що обумовлювала введення препарату в черевну порожнину через дренажні трубки кілька разів з проміжком у 6 годин, не застосовувалась в абдомінальній хірургії, зокрема після холецистектомії. Вона надзвичайно проста і не вимагає застосування спеціальної апаратури. Завдяки кратному введенню місцевого анестетика методика забезпечує рівномірний і пролонгований знеболюючий ефект, що дозволяє використовувати дію бупівакаїну більш оптимально.

Отримані результати вкотре підкреслюють переваги мультимодального післяопераційного знеболювання пацієнтів після ЛХЕ, в основі якого лежить диференційний підхід до кількісного та якісного підбору засобів в лікуванні больового синдрому. Таким чином, отримані результати доводять,

Таблиця 2
Кількість балів за візуально-аналоговою шкалою в групах

	ВАШ 1 год	ВАШ 4 год	ВАШ 8 год	ВАШ 12 год	ВАШ 24 год
Група № 1	2,02±0,32	4,67±0,42	5,98±0,44	4,91±0,32	2,65±0,31
Група № 2	1,14±0,07*	2,45±0,26*	3,86±0,17*	3,16±0,35*	2,62±0,43

Примітка: *- достовірна зміна показника по відношенню до такого ж в групі № 1

що внутрішньочеревне застосування бупівакаїну має виражений знеболюючий ефект.

ВИСНОВОК

Внутрішньочеревне введення бупівакаїну в дозі 50 мг (40 мл 0,125% розчину) має виражений знеболюючий ефект після лапароскопічних холецистектомій, який проявляється достовірним зменшенням в 1,47-1,77 рази показника болю за ВАШ та зниженням середньої дози використаного фентанілу для знеболення в 1,55 рази.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що не мають конфлікту інтересів, який може сприйматися таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організацій.

REFERENCES

1. Acute cholecystitis. Adapted Evidence Based Clinical Instruction // Annex to the Ministry of Health Order. 2016. [in Ukrainian]. URL: http://as-ukr.org/wp-content/uploads/2016/06/2016_02_29_AKN_Gostrih-choletsistit.doc.
2. Korotkij V.N., Solyarik S.A., Globa I.V. Postoperative analgesia of laparoscopic interventions using a local anesthetic of lidocaine // Biol. knowledge and intensive therapy. 2008; 4: 52-60. [in Russian]
3. Ovechkin A.M., Efremenko I.V. Pharmacotherapy of acute postoperative pain based on the use of drugs acting on the NMDA receptor complex // Anesthesiology and Intensive Care 2013; 3: 63-9. [in Russian]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/farmakoterapiya-ostroy-posleoperatsionnoy-boli-osnovannaya-na-primenenii-preparatov-vozdeystviyu-schih-na-nmda-retseptorny-kompleks>
4. Sviridov S.V., Vedenina I.V., Tejlor S.D. Pain after laparoscopic cholecystectomy // GBO VPO "Russian Research Medical University named after N.I. Pirogov Ministry of Health of the Russian Federation" 2016; 4: 262-72. [in Russian] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolevoy-sindrom-posle-laparoskopicheskoy-choletsistektomii>
5. Толеска М., Карталов А., Кузмановска Б. Ефект от на интраперитонеално дадениот bupivacaine во намалување на болката по лапароскопска холецистектомија // Прилози. Одд. за мед. Науки 2018; XXXIX 1: 123-9. DOI: 10.2478/prilozi-2018-0032
6. Banoria N.K., Prakash S., Sharma O.K. Effect of local anesthetic instillation intraperitoneally on post-op pain relief after laparoscopic cholecystectomy // Indian Journal of Clinical Anatomy and Physiology. 2016; 3 (3): 322-5.
7. Blichfeldt-Eckhardt M.R., Ording H., Andersen C. Early visceral pain predicts chronic pain after laparoscopic cholecystectomy // Pain. 2014; 155 (11): 2400-7. DOI: 10.1016/j.pain.2014.09.019.
8. Chiruvella S., Nallam S.R. Intraperitoneal instillation of ropivacaine plus dexmedetomidine for pain relief after laparoscopic hysterectomy: A comparison with ropivacaine alone // J NTR Univ Health Sci. 2016; 5: 93-7. DOI: 10.4103/2277-8632.185432
9. Ingelmo P., Bucciero M., Somaini M. Intraperitoneal nebulization of ropivacaine for pain control after laparoscopic cholecystectomy: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial // Br. Anaesth. 2013; 110 (5): 800-6. DOI: 10.1093/bja/aes495.
10. Griffin E.M., Prystowsky H., Hingson R.A. The use of topical anaesthesia of the peritoneum in poor risk surgery and in augmenting inadequate vertebral conduction anaesthesia // N Z Med J. 1951; 50: 31-3. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14827144>
11. Kahokehr A. Intraperitoneal local anesthetic for postoperative pain // Saudi J Anaesth. 2013; 7 (1): 5. DOI: 10.4103/1658-354X.109554.
12. Lin S., Hua J., Xu B., Yang T., He Z. Comparison of bupivacaine and parecoxib for postoperative pain relief after laparoscopic cholecystectomy: a randomized controlled trial // Int. J. Clin. Exp. Med. 2015; 8 (8): 13824-9. eCollection 2015. PMID: PMC4613017
13. Reddy V.S., Brown J.D., Ku B., Gilchrist B.F. Effect of Pain Medication Choice on Emergency Room Visits for Pain after Ambulatory Laparoscopic Cholecystectomy // Am. Surg. 2015; 81 (8): 826-8. PMID: 26215248

Отримано: 09.11.2017

INTRAPERITONEAL USING OF BUPIVACAINE FOR THE ANESTHESIA OF PATIENTS AFTER LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY

¹Glumcher F.S., ²Solyaryk S.O., ¹Olynyk O.V., ¹Kolosovych A.I.

¹Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

²Kyiv City Hospital 4, Kyiv, Ukraine

Relevance. The local anesthetics were used intraperitoneally after some minimally invasive gynecological interventions like a component of postoperative multimodal anesthesia in recent years.

Objective. The aim of work was to study the effectiveness of intraperitoneal administration of bupivocaine for the anesthesia of patients after laparoscopic cholecystectomy.

Material and methods. 28 patients aged 32-60 years (16 women, 12 men) were examined. The patients were divided into two groups. In the first group for anesthesia after the operation, was used ketorolac trometamine in dose 0.2 mg/kg intramuscularly each

6 hours. If the patient complained of postoperative pain, which was assessed by Visual-analog scale in 7 points or higher, fentanyl was administered intramuscularly in dose of 0.003 mg/kg. In the second group, besides the components of multimodal anesthesia used in the first group, at the end of the surgical intervention at the drainage tubes were injected 40 ml of 0.125% solution of bupivacaine (50 mg). This injection was repeated throughout the first day each 6 hours. The condition of patients was assessed by a Visual-analog scale after 1, 4, 8, 12 and 24 hours after the finishing of surgery. The average dose of fentanyl in mg/kg used for postoperative anesthesia first 24 hours after operation was also determined.

Results. We have received a significant reduction in the rates of pain evaluation for Visual-analog scale in patients who used bupivacaine as a component of multimodal anesthesia. One hour after the end of the operation, the pain score for Visual-analog scale was less than the corresponding one in the control group in 1.77 times, after 4 hours – in 1.47, and in 8 hours – in 1.55 times. In all cases, $P < 0.001$. The mean dose of fentanyl used for treatment in the study group was 1.55 times less than that in the control group. There were no significant complications in both groups. A patient in group 1 had nausea, requiring a single dose of ondasetron 2 mg.

Conclusion. Intraperitoneal administration of bupivacaine had a significant anesthetic effect after laparoscopic cholecystectomy.

Key words: postoperative pain, VAS scale, intraperitoneal injection, bupivacaine, multimodal anesthesia

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИБРЮШНОГО ВВЕДЕНИЯ БУПИВАКАИНА В ОБЕЗБОЛИВАНИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

¹Глумчер Ф.С., ²Солярик С.О., ¹Олейник А.В., ¹Колосович А.И.

¹Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина

²Киевская городская клиническая больница № 4, Киев, Украина

Актуальность. В последнее время при некоторых малоинвазивных гинекологических вмешательствах в качестве компонента послеоперационного мультимодального обезболивания начали использовать внутрибрюшное введение местных анестетиков.

Целью данной работы было изучение эффективности бупивакаина при внутрибрюшном введении для обезболивания пациентов после лапароскопической холецистэктомии.

Материалы и методы. Обследовано 28 пациентов в возрасте от 32 до 60 лет (16 женщин и 12 мужчин), которым проводили лапароскопическую холецистэктомию. Больные были разделены на две равные по количеству пациентов группы. В первой группе для обезболивания после операции использовали кеторолака трометамин по 0,2 мг/кг внутримышечно через каждые 6 часов. Если больной жаловался на послеоперационную боль, которая по визуально-аналоговой шкале оценивалась в 7 и более баллов, применяли фентанил, который вводили внутримышечно в дозе 0,003 мкг/кг. Во второй группе, кроме компонентов мультимодального обезболивания, которые применяли в первой, в конце оперативного вмешательства в дренажные трубки вводили 40 мл 0,125% раствора бупивакаина (50 мг). Введение повторяли в течении первых суток через каждые 6 часов. Состояние больных оценивали по визуально-аналоговой шкале через 1, 4, 8, 12 и 24 часа после окончания операции. Также определяли среднее количество фентанила в мкг/кг, которое было использовано для обезболивания одного пациента.

Результаты. Наблюдали достоверное снижение показателей оценки боли по ВАШ у пациентов, которым в качестве компонента мультимодального обезболивания использовали бупивакаин. Через час после окончания операции показатель оценки боли по ВАШ был меньше соответствующего в контрольной группе в 1,77 раза, через 4 часа – в 1,47, а через 8 – в 1,55 раза. Во всех случаях $P < 0,001$. Средняя доза использованного для обезболивания фентанила в исследовательской группе была достоверно в 1,55 раза меньше таковой в контрольной группе. Существенных осложнений в обеих группах не было. У больного в группе 1 наблюдалась тошнота, требовавшая однократного введения ондасетрона 2 мг.

Вывод. Внутрибрюшное введение бупивакаина имело выраженный обезболивающий эффект после лапароскопических холецистэктомий.

Ключевые слова: послеоперационная боль, шкала ВАШ, внутрибрюшное введение, бупивакаин, мультимодальное обезболивание.