DOI: <https://doi.org/10.32345/2664-4738.3-4.2019.02>
УДК 616.37-008.64-092 :001.892.57

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ

¹*Натрус Л.В.* (<https://orcid.org/0000-0002-0416-2600>)

¹*Осадчук Ю.С.* (<https://orcid.org/0000-0002-1365-4930>)

²*Лабудзинський Д.О.* (<https://orcid.org/0000-0003-4389-6049>)

¹*Чайковський Ю.Б.* (<https://orcid.org/0000-0002-8821-8930>)

³*Смирнов А.С.* (<https://orcid.org/0000-0002-1562-4591>)

¹*Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна*

²*Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ, Україна*

³*ДЗ «Луганський державний університет», Рубіжне, Україна
Lnatrus777@gmail.com*

Актуальність. При моделюванні експериментального цукрового діабету 2 типу (ЦД2) різні школи та наукові групи отримують значну варіабельність змін в тканинах, яку складно порівняти і екстраполювати як певний патогенетичний або фармакологічний вплив. Відсутність узгоджених у науковому середовищі стандартів операційних процедур значно ускладнює інтерпретацію отриманого результату. Тому створення уніфікованої патогенетично обґрунтованої моделі ЦД2 на тваринах є актуальною задачею.

Мета. Визначення комбінацій екзогенних впливів для найбільш ефективного відтворення експериментальної моделі ЦД2 на щурах та патогенетичне обґрунтування отриманих змін в організмі для вивчення центральних механізмів регуляції гомеостазу та їх фармакологічної корекції.

Матеріали та методи. ЦД2 моделювали шляхом надання щурам харчового навантаження високо-жировою дієтою (High Fat Diet – HFD) із додатковою індукцією стрептозотоцином. Проводили оцінку моделі шляхом антропометричних вимірів, дослідження біохімічних параметрів, тесту толерантності до інсуліну, аналізу спектру жирних кислот в складі тканин. Статистичну обробку даних проводили за допомогою пакету IBM SPSS Statistics 23.

Результати. Отримані дані співставили із нашими дослідженнями ліпідного метаболізму хворих із різним ступенем діабетичної ретинопатії на тлі ЦД2 і аналізом інформативності біохімічних маркерів для оцінки порушення ліпідного метаболізму на тлі гіперглікемії у пацієнтів. Виявили, що моделювання на щурах експериментального ЦД2 шляхом харчового навантаження HFD (45%)+фруктоза 20% протягом 3 місяців із подальшою однократною індукцією стрептозотоцином (25 мг/кг), викликає зміни ліпідного та вуглеводного метаболізму в організмі тварин, співставні із аналогічними змінами в організмі людини із діагностованим тривалим ЦД2 із розвинутими мікросудинними ускладненнями.

Висновок. Ми визначили оптимальну комбінацію впливів та розробили послідовну схему експериментального навантаження, яка дозволяє отримати в експерименті тваринну модель ушкоджень на кшталт ЦД2. За допомогою діагностичного алгоритму, який включає фізіологічні й лабораторні методи, визначили ступінь ушкоджень органів та систем, провели порівняння із рівнем метаболічних порушень у пацієнтів з ЦД2 та осіб без діабету. Наведена модель є патогенетично обґрунтованим підходом для подальшого вивчення центральних механізмів регуляції гомеостазу та їх фармакологічної корекції.

Ключові слова: стрептозотонин, жирні кислоти, високо-жирова дієта, інсулінорезистентність

Актуальність. Дослідження шляхів лікування цукрового діабету 2 типу (ЦД2), а головне – його ускладнень, а також з метою профілактики розвитку нейро-, нефро-, кардіо-, ретикулопатії тощо, не зменшує актуальності, оскільки захворювання є дуже розповсюдженим як у світі, так і в нашій країні й складає патогенетичну основу розвитку метаболічного синдрому (МС). Вивчення механізмів фармакологічного впливу препаратів на системи, органи та клітини супроводжується відтворенням експериментальної моделі на тваринах із оцінкою її адекватності параметрам ушкодження, які виника-

ють у людини. Не зважаючи на багато спроб змоделювати на тваринах адекватну експериментальну модель ЦД, дослідники стикаються із рядом проблем, оскільки ЦД2 це складне гетерогенне захворювання, із ланкою патогенетичних перетворень, які ґрунтуються на генетичній схильності, дієтичному напруженні та ряду ендогенних механізмів, які і сьогодні залишаються не вивченими.

В ряді робіт наводяться приклади моделювання МС в експерименті на щурах, але важливо підкреслити, що повноцінний комплекс змін у вигляді поліметаболічного симптомокомплексу, що був описа-

ний у людини ще у 1967 році, як поєднання гіперліпідемії з ЦД, гіпертензією та помірним ожирінням, у щурів диких ліній не розвиваються, оскільки такі стани як гіпертензія можливо спостерігати лише у щурів із генетичними мутаціями [1-4]. Використання генетично модифікованих тварин є досить коштовним, тому дослідники частіше використовують дику лінію і намагаються моделювати ЦД2 шляхом використання екзогенних впливів, дієти та хімічних речовин. Однак, описано багато варіацій впливів та навантаження, оскільки різні школи та наукові групи використовують різні комбінації підходів і відповідно отримують значну варіабельність змін в тканинах, яку складно порівняти і екстраполювати як певний патогенетичний або фармакологічний вплив. Відсутність при дослідженні узгоджених в науковому середовищі стандартів операційних процедур (СОП) значно ускладнює інтерпретацію отриманого результату. Так, враховуючи зростаючу кількість мишачих моделей метаболічних захворювань, зокрема діабету та ожиріння, в роботі [11] наведені посилання на СОП метаболічних тестів гомеостазу глюкози у мишей, що розроблені консорціумом Mouse Metabolic Phenotyping Center (MMPC) [7]. Автори визнають, що неможливо проводити всі метаболічні випробування однаково точно в різних лабораторіях, оскільки ступінь матеріальних можливостей, технічного оснащення, реагентів тощо в лабораторіях суттєво розрізняється. Однак певні параметри можна стандартизувати, незалежно від того, де проводяться випробування, і це надасть авторам та рецензентам необхідну інформацію для інтерпретації результатів, яка може відрізнитися внаслідок відмінностей у методології [11].

Так, в нашій лабораторії відтворені моделі стійкої гіперглікемії у щурів за допомогою стандартизованого підходу, шляхом введення препаратів алоксану (Allox) та стрептозотину (STZ) [6]. Ми проводили порівняння зміни жирнокислотного складу ліпідів кардіоміоцитів та гепатоцитів у щурів з ЦД 1 типу, створеним за різними моделями. Прийшли висновку, що Allox модель віддзеркалює агресивну дію високоактивних радикалів і може успішно використовуватися для вивчення механізмів оксидативного стресу, який обов'язково виникає за умов гіперглікемії. Розвиток STZ моделі ЦД відображає менш трагічні наслідки uszkodження клітин, і таке моделювання доцільно використовувати при вивченні порушень тканин та органів, які виникають при тривалій та стійкій гіперглікемії [6].

Однак, для вивчення тонких регуляторних механізмів підтримки гомеостазу організму, які забезпечують структури центральної нервової системи – перш за все гіпоталамічні ядра [16], а також для дослідження фармакологічного впливу препаратів, які можуть виконувати роль нейропротекторів за умов ЦД2, МС та інших розповсюджених станів

комбінованого порушення ліпідного та вуглеводного обміну, необхідно використовувати експериментальну модель, за патогенетичними розвитком близьку до ЦД2.

Мета роботи. Визначення комбінацій екзогенних впливів для найбільш ефективного відтворення експериментальної моделі ЦД2 на щурах та патогенетичне обґрунтування отриманих змін в організмі для вивчення центральних механізмів регуляції гомеостазу та їх фармакологічної корекції.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Для експерименту були відібрані самці здорових білих щурів Wistar, масою 150-165 грамів, які утримувалися в віварії НМУ імені О.О. Богомольця на стандартному харчуванні (комбікорм) та вільному доступі до води. Щури були поділені на 2 групи. В 1 групі моделювали патологію. А 2 група – це група контролю, що знаходилася в окремих клітках весь час експерименту із аналогічним впливом температурного та світлового режиму. ЦД2 моделювали шляхом надання щурам харчового навантаження протягом трьох місяців із додатковою індукцією стрептозототином. Харчову суміш розділяли на порції із розрахунку 30 г на 1 тварину на добу і надавали щоденно вранці. Усі маніпуляції з піддослідними тваринами проводили з дотриманням загальноприйнятих біоетичних норм гуманного поводження з лабораторними тваринами у відповідності до міжнародних та національних положень стосовно проведення експериментів із залученням тварин: «Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986); «Загальні етичні принципи проведення експериментів на тваринах» (Україна, 2001 р.), Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 3447-IV (Україна, 2006), засідання Комісії з Біоетики НМУ, протокол № 123 від 23.12.2019 р.

Після 3 місяців такого годування, тваринам однократно внутрішньочеревинно вводили стрептозототин (STZ, Sigma №SO 130, США) із розрахунку 25 мг/кг маси тіла, розчинений у цитратному буфері і переводили на стандартне годування комбікормом. Через 2 тижні проводили оцінку адекватності моделі шляхом антропометричних вимірів, дослідження біохімічних параметрів, тесту толерантності до інсуліну, аналізу спектру жирних кислот (ЖК) в складі тканин тощо. Біохімічні показники сироватки крові вимірювали в лабораторії клінічної лабораторної діагностики Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини (НДІ ЕКМ) НМУ імені О.О. Богомольця на напівавтоматичному аналізаторі BS-3000M виробництва «Sinnowa» (Китай), із використанням біохімічних наборів «Diagnosticum Inc» (Угорщина).

Дослідження складу ЖК проводили методом газозово-рідинної хроматографії за стандартною методикою [5]. Ідентифікували ЖК за піками на хроматограмі, порівнюючи час їх утримання з часом утримання піків стандартних чистих речовин з відомим якісним та кількісним складом. Кількісну оцінку спектра ЖК проводили методом нормування площин піків метильованих похідних ЖК та визначали їхній склад у відсотках, де за 100% приймали суму ЖК в об'ємі усієї суміші. У спектрі ЖК ліпідів мозкової тканини та печінки було ідентифіковано 9 найінформативніших ЖК: із них міристинова C14:0, пентодеканова C15:0, пальмітинова C16:0, маргарінова C17:0, стеаринова C18:0, що складають суму насичених жирних кислот (НЖК); олеїнова C18:1, лінолева C18:2, ліноленова C18:3, арахідонова C20:4, групу ненасичених жирних кислот (ННЖК). Лінолева C18:2, ліноленова C18:3, арахідонова C20:4 ЖК входять у суму поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) і визначаються як незамінні.

Статистичну обробку даних проводили за допомогою пакету IBM SPSS Statistics 23. Для перевірки розподілу на нормальність використано критерій Шапіро-Уїлка. Оскільки розподіл за усіма показниками відповідав нормальному – дані аналізували у вигляді середнього значення та стандартної похибки. Діаграми наведені із вказанням 95% довірчого інтервалу. Для порівняння показників на всіх термінах спостереження було використано критерій множинного порівняння – критерій Шеффе. Вважали, що дані відрізняються за $P < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Для вивчення в експерименті стану комбінованого порушення ліпідного та вуглеводного обміну, який виникає у людини і складає патогенетичну основу МС, з нашої точки зору, важливо досягнути розвитку інсулінорезистентності (ІР). Оскільки ІР є основним інтегральним механізмом, навколо якого формується ланцюг метаболічних і гемодинамічних порушень і формується симптомокомплекс МС. У 1989 р. N. Kaplan додатково виділив абдомінальне ожиріння, як найважливіший етіологічний фактор формування ІР, та, об'єднавши його з артеріальною гіпертонією, ЦД і гіпертригліцеридемією, ввів поняття «смертельний квартет». У 1992 р. Naffner запропонував термін «синдром інсулінорезистентності» [10]. Під терміном «інсулінорезистентність» прийнято розуміти зниження реакції інсулінчутливих тканин на інсулін при його достатній концентрації, що приводить до хронічної компенсаторної гіперінсулінемії. В основі зниження чутливості до інсуліну може лежати порушення здатності інсуліну пригнічувати продукцію глюкози в печінці і/або стимулювати захоплення глюкози периферичними тканинами. Оскільки у здорових людей 75-80%

глюкози утилізується скелетної мускулатурою, основною причиною ІР вважається порушення утилізації глюкози скелетними м'язами.

Історично вважалося, що уявлення про патогенез ЦД2 обертається навколо вісі «глюкоза-інсулін», і діабет є розладом, в першу чергу пов'язаним з порушенням метаболізму глюкози. Пізніше патогенез ЦД2 почали розглядати в контексті основних порушень ліпідного обміну. Сьогодні доведено, що підвищення в плазмі вмісту вільних жирних кислот грає ключову роль в розвитку ЦД2, викликаючи ІР. Цей механізм є зрозумілим через усвідомлення еволюційного шляху раціонального використання енергетичного «палива» в організмі. Відповідно до гіпотези «економного гену», ймовірність того, що людина виживе під час голоду, буде збільшена, якщо вона зможе накопичувати енергію (у вигляді жиру) під час надлишку їжі, а потім під час голодування збережений жир може бути використаний. Для цього адіпоцити поглинають і зберігають ЖК, а при зменшенні надходження в організм продуктів, що вміщують «легкі» джерела енергії – вуглеводи, ЖК вивільняються із жирової тканини, і інші тканини використовують їх в якості енергетичного палива. Але, якщо рівень ЖК в плазмі підвищується більш, ніж на кілька годин, виникає ЖК-індукована ІР, яка сприяє збереженню вуглеводів для використання тканинами, наприклад, нервової, які не використовують інший енергетичний субстрат. Це дуже обґрунтований механізм для раціонального виживання і роботи мозку під час голодування, або в другій половині вагітності, коли резистентність до інсуліну у матері зберігає глюкозу для зростаючого плоду, але в інших випадках ЖК-індукована ІР стає контрпродуктивною.

В експерименті харчове навантаження у вигляді високожирової дієти (High Fat Diet – HFD) є досить розповсюдженим екзогенним фактором, який викликає підвищення маси тіла експериментальних тварин. Однак доза жиру, його склад, та головне – тривалість харчування – суттєво розрізняються у дослідників [4, 8]. Як відомо, харчування фруктозою сприяє розвитку ІР, оскільки виключає стимулювання інсулінового апарату підшлункової залози [3, 4]. Дослідження [4] із фруктозною стимуляцією показали, що використання 10% розчину фруктози впродовж 8 тижнів сприяло помірному збільшенню маси тіла та незначному підвищенню рівня глюкози. Застосування 60% розчину фруктози мало певні переваги у виразності основних клінічних ознак ІР (розвиток гіперглікемії, гіпертригліцеридемії, гіперхолестеринемії, підвищення концентрації ЛПНЩ). Автори вважають високофруктозну дієту оптимальною моделлю для експериментального формування ІР [4].

В нашій роботі для виготовлення гомогенної харчової суміші ми використали ретельно подрібне-

Рис. 1. Характеристика відносного вмісту харчових компонентів в суміші HFD-2 для харчового навантаження щурів (А) та порівняльний аналіз вмісту жирних кислот (Б) в складі суміші HFD-1 та HFD-2.

ний стандартний комбікорм віварію, поєднаний із попередньо розтопленим чистим свинячим внутрішнім жиром. Природна емульгація жиру в кишечнику щурів та покращення всмоктування ентероцитом забезпечувалося додавання в суміш медичної жовчі в об'ємі до 1%. Для визначення ефективної кількості долі жиру в суміші був проведений аналіз (рис.1) складу ЖК двох комбінацій харчової суміші HFD-1, в складі якої відсоток жиру складав 50 % і були добавлені соя, протеїн та пшеничні хлібці, та HFD-2, в якій вміст жиру був зменшений до 45%, але 20% суміші складала суха фруктоза й інший об'єм доповнював комбікорм.

Для нашої моделі ми обрали суміш HFD-2, оскільки намагалися відтворити комплексне ліпідне та вуглеводне навантаження. Важливим було питання терміну годування тварин – оскільки дослідники вказують, що вже через 3 тижні високожирової дієти можна очікувати ефективну зміну параметрів організму тварини [8]. Спостереження за масою тіла тварин та рівнем глюкози показало, що лише через 6-8 тижнів можна очікувати на результат, що повністю збігається із спостереженням [15]. Роль ЖК в індукції ІР очевидна, хоча механізми її реалізації продовжують вивчатися. За умов HFD, у тварини активується механізм використання ЖК у вигляді енергетичного субстрату замість глюкози, тим більш, що в нашій моделі глюкоза повністю замінена фруктозою. Функціональна редукція β -клітин підшлункової залози, яка вже виникає через 7-8 тижнів харчування HFD, може бути додатково посилена введенням STZ, що активно використовується дослідниками для збільшення ефекту ЖК-індукованої ІР. В нашій моделі введення STZ проводили однократно внутрішньочеревинно через 3 місяця харчового на-

вантаження, а після ін'єкції тварин переводили на стандартний корм віварію і спостерігали ще протягом двох тижнів. Через вказаний термін вважали модель завершеною і усіх експериментальних тварин рандомно поділяли на групи для здійснення фармакологічного впливу і вивчення дії препарату. Згідно фармакологічних рекомендацій [9] вивчення дії препарату, який вводили *per os* через металевий зонд, розчиненим у воді для ін'єкцій, супроводжується порівнянням із групою плацебо (введення води для ін'єкцій) і препаратом порівняння (метформін, розчиненим у воді для ін'єкцій) в аналогічній дозі.

Таким чином, наша модель відтворення патогенетичних змін в організмі тварини на кшталт ЦД2 із подальшою фармакологічною корекцією виглядала наступним чином (рис. 2).

Важливим для проведення експерименту, згідно біоетичних норм та рекомендацій, є розрахунок

Рис. 2. Блок-схема дослідження фармакологічного впливу препарату на організм за умов експериментального ЦД2, відтвореного шляхом харчового навантаження HFD+фруктоза із індукцією STZ.

кількості тварин в групі, як необхідний мінімум, який дозволяє досягнення статистично достовірної різниці. Для планування загального об'єму тварин в групі «n» ми використовували формулу: $n = \frac{t^2 \sigma^2}{\Delta^2}$ де t – коефіцієнт довіри, σ – дисперсія варіаційної ознаки, Δ – гранична помилка вибірки. Дані розраховували на основі попереднього вимірювання у щурів в різних клінічних станах вмісту насичених та ненасичених ЖК, арахідонової ЖК, глюкози та глікірованого гемоглобіну тощо. За результатами розрахунків прийшли висновку, що в кожній підгрупі мінімальна, але достатня кількість щурів дорівнює 6 тварин.

Оцінка ступеню ІР у щурів з ЦД2 проводилася за допомогою еуглікемічного гіперінсулінемічного клемп тесту (hyperinsulinemic-euglycemic clamp) (ЕГК, клемп-тест), який використовується для визначення ІР з 70-х років [7, 10, 11]. Суть методу полягає в гострому підвищенні концентрації інсуліну в крові і одночасному введенні глюкози для підтримки еуглікемії (близько 5,5 ммоль/л). При досягненні стійкого рівня еуглікемії кількість введеної глюкози буде відповідати швидкості захоплення глюкози тканинами, саме під дією інсуліну. Клемп-тест – найнадійніший і точний метод діагностики, який дозволяє не тільки дати кількісну оцінку ІР, а й визначити, що лежить в основі зниженої чутливості до інсуліну (порушення здатності інсуліну пригнічувати продукцію глюкози в печінці або стимулювати захоплення глюкози периферичними тканинами). Незважаючи на наявність чітких критеріїв

інтерпретації, ЕГК в тому вигляді, у якому був пропонується для людей, він досить рідко застосовується для дослідницьких цілей і практично не використовується в клінічній практиці. Оскільки для його виконання потрібно додаткове технічне оснащення (калібровані помпи для дозованої інфузії глюкози і інсуліну, два постійних внутрішньовенних доступу, обладнання для експрес-аналізу рівня глюкози крові) і спеціально навчений персонал [10].

Ми взяли за основу принцип інсулінового навантаження на тлі еуглікемії, але провели власні розрахунки дози та шляхів введення. Водний розчин глюкози (2 г/кг) вводили тварині *per os* (1 мл) та через 5 хвилин однократно підшкірно вводили інсулін (Актрапід), із розрахунку 0,175 ОД/кг маси. Рівень глюкози вимірювали глюкометром в капілярній крові хвоста 6 разів: базовий – до введення глюкози, та через 15, 30, 45, 60 та 90 хвилин після ін'єкції інсуліну. Варто підкреслити, нам не вдалося повністю притримуватися СОП Intraperitoneal Insulin Tolerance Test, від ММРС [7], оскільки у вказаному документі рекомендовано використовувати інсулін для мишей виробництва Eli Lilly (*per mouse*) в дозі 0,75Од-1,0 Од. Його заміна препаратом іншого виробника потребувала перераховувати дозу введення.

Отримані дані (рис. 3) можна інтерпретувати як суттєве гальмування виділення інсуліну у відповідь на глюкозну стимуляцію в групі ЦД2 у порівнянні із групою контролю.

Оцінка зміни антропометричних параметрів (табл.) у щурів експериментальної моделі ЦД2Т показала достовірні підвищення в 1,65 рази ($P < 0,05$)

Рис. 3. Показники оцінки тесту толерантності до інсуліну: дані щурів (n=6) контрольної групи (суцільна лінія) та щурів (n=6) із ЦД2 (пунктир), до введення речовин – 0 хв та в динаміці кожні 15 хвилин: А – рівень глюкози крові, Б – дельта глюкози у порівнянні із рівнем в 0 хв. * – відмінність на рівні $P < 0,05$.

маси тіла) збільшення у 1,45 разів ($P<0,05$) довжини талії та збільшення у 1,15 ($P<0,05$) довжини тіла.

Аналіз біохімічних параметрів показав наявність достовірного підвищення в крові тварин рівня глюкози у 2 рази ($P<0,05$), та рівня глікованого гемоглобіну у 1,76 разів ($P<0,05$) і відсутність достовірних відмінностей показників ліпідограми щурів, у яких відтворювали модель ЦД2, окрім показника ЛПНЩ.

Оцінка вмісту ЖК в тканинах показала суттєву достовірну різницю перерозподілу ЖК тварин з експериментальним ЦД2 у порівнянні із контрольною групою, а також відмінності спектру ЖК в різних органах експериментальних щурів, зокрема печінки та головного мозку. Аналіз цих даних наведений в нашій іншій роботі, де ми дійшли висновку, що у щурів з ЦД2, в порівнянні із КГ, в тканині печінки і в тканині мозку вміст НЖК підвищився в 1,3 рази ($P<0,05$), за рахунок С16:0 – пальмітинової ЖК, вміст ННЖК знизився в 1,3 рази ($P<0,05$), і зменшилася доля ПНЖК в 1,8 разів ($P<0,05$). Відмінності в органах виявилися за рахунок міnorних НЖК: в печінці щурів з ЦД2 виявили підвищення в 4 рази мірістинової ($P<0,05$), підвищення в 1,4 рази пентадеканової ($P<0,05$) і в 2 рази ($P<0,05$) маргаринової. В мозку щурів з ЦД2Г в 2 рази ($P<0,05$) підвищився вміст мірістинової та пентадеканової, і з'явилася маргаринова, яка не виявлялася у щурів КГ. В печінці щурів КГ та ЦД2 вміст ННЖК суттєво змінився за рахунок зменшення в 3,5 рази ($P<0,05$) арахідонової і підвищення в 2 рази ($P<0,05$) лінолевої. В мозковій тканині щурів з ЦД2 виявили зменшення в 2 рази ($P<0,05$) лінолевої, підвищення арахідонової в 2 рази ($P<0,05$), та визначили ліноленову, що не було притаманним для щурів КГ. Таким чином, ми виявили, що у щурів з експериментальним ЦД2 достовірно збільшуються показники маси тіла, вуглеводного обміну і вміст ЖК, як відображення структурних змін ліпідного обміну в тканинах, а вміст в сироватці крові транспортних ліпідних комплексів і загальний холестерин не показали суттєвих відмінностей.

Отримані дані ми співставили із нашими дослідженнями ліпідного метаболізму хворих із різним ступенем діабетичної ретинопатії (ДР) на тлі ЦД2 [13] і аналізом інформативності біохімічних маркерів для оцінки порушення ліпідного метаболізму на тлі гіперглікемії у пацієнтів із ДР [12]. При цьому в останній роботі ми порівнювали групи відносно здорових осіб, пацієнтів із діагностованим тривалим ЦД2, та пацієнтів без ЦД2, але із визначеними метаболічними зсувами, за показниками ліпідного та вуглеводного обміну. Ми прийшли висновку, що у пацієнтів із ЦД2 показники загального холестерину та ЛПВЩ та тригліцеридів не мали достовірної різниці у порівнянні із здоровими особами. Основною відмінністю ліпідного обміну пацієнтів з ускладненим тривалим ЦД2 та здорових осіб була суттєва різниця перерозподілу вмісту ЖК в мембранах еритроцитів у вигляді підвищення «насиченості». Вміст НЖК у пацієнтів з ЦД2 був вище, ніж в КГ за рахунок пальмітинової, мірістинової, пентадеканової та маргаринової ЖК. Вміст ННЖК змінювався різнонаправлено, але суттєво зменшувався вміст лінолевої та арахідонової ЖК. Вважається, що саме розподіл ЖК в мембранах клітин є найбільш важливим параметром, за яким оцінюють ступінь порушення ліпідного метаболізму [14].

Для наочності відтворених змін у експериментальних тварин, вважаємо доцільним навести діаграми перерозподілу вмісту інтегральних компонентів ЖК в мембранах еритроцитів пацієнтів вказаних груп (рис. 4-А) для співставлення із змінами вмісту ЖК, які ми спостерігали в печінці експериментальних щурів (рис 4-Б).

Одже, ми визначили оптимальну комбінацію впливів, та розробили послідовну схему навантаження, яка дозволяє отримати в експерименті тваринну модель на кшталт ЦД2. За допомогою діагностичного алгоритму, який включає фізіологічні та лабораторні методи, визначили ступінь ушкоджень органів та систем і провели порівняння із рівнем метаболічних порушень у пацієнтів з ЦД2 та осіб без діабету.

Таблиця

Порівняння антропометричних та біохімічних параметрів щурів за умов моделювання експериментального ЦД2

Параметр	КГ	ЦД2	Значущість відмінностей
Маса тіла, гр	176±8,3	291±17,63*	$P<0,05$
Довжина тіла, см	20±0,31	23±0,63*	$P<0,05$
Талія, см	11,8±0,48	16,0±0,31*	$P<0,05$
Глюкоза, ммоль/л	4,83±0,39	9,55±0,59*	$P<0,05$
HbA1C (%)	5,17±0,69	9,01±0,85*	$P<0,05$
Холестерин, ммоль/л	1,96±0,16	2,09±0,23	$P>0,05$
Тригліцериди, ммоль/л	0,65±0,05	0,69±0,03	$P>0,05$
ЛПВЩ, ммоль/л	1,58±0,18	1,55±0,24	$P>0,05$
ЛПНЩ, ммоль/л	0,082±0,016	0,278±0,061*	$P<0,05$

Примітка: визначення статистичної значимості відмінностей проводили за допомогою критерію Шеффе

Рис. 4. Вміст (%) суми насичених (1), ненасичених (2), поліненасичених (3) ЖК в складі мембрани еритроцитів людей (А) та тканини печінки щурів (Б). I – група здорових осіб, II – пацієнти без ЦД2, але із підвищеними біохімічними показниками ліпідного та вуглеводного обміну, III – пацієнти із довготривалим ЦД2, ускладненим ДР, IV – щури контрольної групи, V – щури із експериментальним ЦД2.

Примітка: * – відмінність із відповідним показником контрольної групи $P < 0,05$.

ВИСНОВОК

Моделювання на щурах експериментального ЦД2 шляхом харчового навантаження HFD (45%)+фруктоза 20% протягом 3 місяців із подальшою однократною індукцією стрептозотоцином (25 мг/кг), викликає зміни ліпідного та вуглеводного метаболізму в організмі тварин, співставні із аналогічними змінами в організмі людини із діагностованим тривалим ЦД2 із розвинутими мікросудинними ускладненнями.

Наведена модель є патогенетично обґрунтованим підходом для подальшого вивчення центральних механізмів регуляції гомеостазу та їх фармакологічної корекції.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що не мають конфлікту інтересів, який може сприйматися таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.

Джерела фінансування. Робота виконана, як фрагмент Держбюджетної НДР «Структурно-функціональні зміни нейронів медіо-базального гіпоталамусу при порушенні вуглеводного і ліпідного обміну» № держреєстрації 0119U101229, строки виконання 2019-2021 р.р.

REFERENCES

1. Bayrasheva V.K. [Modeling of diabetes mellitus and diabetic nephropathy in the experiment] // Modern problems of science and education. 2015; 4. [in Russian]. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21024>

2. Kravchuk E.N., Galagudza M.M. [Experimental models of metabolic syndrome] // Arterial hypertension. 2014; 20 (5): 377-83. [in Russian]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnye-modeli-metabolicheskogo-sindroma>
3. Leshchenko D.V., Kostyuk N.V., Egorova E.N., Belyakova M.B., Minyaev M.V., Petrova M.B. [Modeling of metabolic syndrome in animals by the action of chemical agents and diet] // Bulletin of TvSU. Series: Chemistry (2). 2015; P. 141-152. ISSN 1995-0152. [in Russian]. URL: <http://eprints.tversu.ru/5385/>
4. Markhon N.O., Mamchur V.I., Zhilyuk V.I., Levykh A.E. Comparative analysis of experimental approaches in the reproduction of metabolic syndrome // Bulletin of problems in biology and medicine. 2015; 1: 156-62. [in Ukrainian]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2015_1_33.
5. Natrus L.V., Ryzhko I.M., Chernovol P.A., Bryuzgina T.S. Patent 125810 UA, IPC G01N 33/49 (2006.01) B01D15 / 08 (2006.01) [Method for the evaluation of tissue damage mechanisms in type 1 experimental diabetes mellitus in rats] / Owner O.O. Bogomolets National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine.- u 201709175; stated on 09/18/2017; published March 12, 2018, Bul. No. 15, 2018 [in Ukrainian].
6. Osadchuk Yu.S., Chaikovsky Yu.B., Natrus L.V., Bryuzgina T.S. [Features of changes in fatty acid composition of tissues in different models of type 1 experimental diabetes] // Medical Science of Ukraine. 2018; 14 (3-4): 13-22. [in Ukrainian]. URL: <https://doi.org/10.32345/2664-4738.3-4.2018.02>

7. Mouse Metabolic Phenotyping Center (MMPC). - <https://www.mmpc.org/shared/document.aspx?id=272&docType=Protocol>
8. Spasov A.A., Babkov D.A., Muleeva D.R., & Mayka O.Yu. [Modeling type 2 diabetes mellitus in rats on a high-fat diet with streptozotocin induction] // Bulletin of the Volgograd State Medical University. 2017; 1 (61): 30-2. [in Russian]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-saharnogo-diabeta-tipa-2-u-krys-na-vysokozhirovoy-diete-s-induktsiey-streptozototsinom>
9. Stefanov OV (ed.) [Preclinical Drug Research. Guidelines] – Kyiv: Avicenna, 2001. 528 p. [in Ukrainian].
10. Tvorogova M.G., Yaskova K.N., Mychka V.B., Chazova I.E. [Insulin resistance and methods of its diagnostics] // Laboratory medicine [in Russian]. URL: <http://www.ramld.ru/articles/article.php?id=20>
11. Ayala J.E., Samuel V.T., Morton G.J. et al. Standard operating procedures for describing and performing metabolic tests of glucose homeostasis in mice // Dis Model Mech. 2010; 3 (9-10): 525-34. <https://doi.org/10.1242/dmm.006239>
12. Bykhovets M. Information value of biochemical markers for evaluation of lipid dysmetabolism secondary to hyperglycaemia in patients with diabetic retinopathy and type 2 diabetes mellitus // East European Scientific Journal (Warsaw, Poland) 2019; 9 (49)/1: 19-25. https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_september_part_1.pdf
13. Bykhovets M.Y., Rykov S.O., Natrus L.V. [Features of the lifestyle as a factor of the risk of development and progression of diabetic retinopathy in patients with diabetes mellitus of 2 types] // Arkhiv oftalmolohiyi Ukrayiny. 2019; 7 (1): 54-61. DOI: <http://dx.doi.org/10.22141/2309-8147.7.1.2019.163000>
14. Koehrer P., Saab S., Berdeaux O., Isanco R., Grigoire S., et al. Erythrocyte Phospholipid and Polyunsaturated Fatty Acid Composition in Diabetic Retinopathy // PLOS ONE. 2014; 9 (9): e106912. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0106912>
15. Lypez M., Rhos-Silva M., Huerta M. Effects of Moringa oleifera leaf powder on metabolic syndrome induced in male Wistar rats: a preliminary study // The Journal of international medical research. 2018; 46 (8): 3327-36. doi:10.1177/0300060518781726.
16. Natrus L.V. Changes in activity of the hypothalamic neurons in response to physiological fluctuations of the homeostasis constants // Fiziolohichnyy zhurnal 2006; 52 (3): 57-63 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16909757>.

Отримано: 28.10.2019

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПУТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

¹Натрус Л.В., ¹Осадчук Ю.С., ²Лабудзинский Д.О., ¹Чайковский Ю.Б., ³Смирнов А.С.

¹Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина

²Институт биохимии им. Палладина, Киев, Украина

³ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Рубежное, Украина
Lnatrus777@gmail.com

Актуальность. При моделировании экспериментального сахарного диабета 2 типа (СД2) различные школы и научные группы получают значительную вариабельность изменений в тканях, которую сложно сравнить и экстраполировать как определенное патогенетическое или фармакологическое воздействие. Отсутствие согласованных в научной среде стандартов операционных процедур значительно усложняет интерпретацию полученного результата. Поэтому создание унифицированной патогенетически обоснованной модели СД2 на животных является актуальной задачей.

Цель. Определение комплекса экзогенных воздействий для наиболее эффективного воспроизведения экспериментальной модели СД2 на крысах и патогенетическое обоснование полученных изменений в организме для изучения центральных механизмов регуляции гомеостаза и их фармакологической коррекции.

Материалы и методы. СД2 моделировали на крысах путем пищевой нагрузки высоко-жировой диетой (High Fat Diet – HFD) с дополнительной индукцией стрептозотоцином. Проводили оценку модели путем антропометрических измерений, исследования биохимических параметров, теста толерантности к инсулину, анализа спектра жирных кислот в составе тканей. Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета IBM SPSS Statistics 23.

Результаты. Полученные данные сопоставили с нашими исследованиями липидного метаболизма пациентов с разной степенью диабетической ретинопатии на фоне СД2 и анализом информативности биохимических маркеров для оценки нарушения липидного метаболизма на фоне гипергликемии у пациентов. Обнаружили, что моделирование на крысах экспериментального СД2 путем пищевой нагрузки HFD (45%) + фруктоза 20% в течение 3 месяцев с последующей однократной индукцией стрептозотоцином (25 мг/кг), вызывает изменения липидного и углеводного обмена в организме животных, сопоставимые с аналогичными изменениями в организме человека с диагностированным длительным СД2 и развитием микрососудистых осложнений.

Вывод. Мы определили оптимальную комбинацию воздействий и разработали последовательную схему экспериментальной нагрузки, которая позволяет получить в эксперименте на животном модель симптомов по типу СД2. С помощью диагностического алгоритма, который включает физиологические и лабораторные методы, определили степень повреждений органов и систем, провели сравнение с уровнем метаболических нарушений у пациентов с СД2 и лиц без диабета. Приведенная модель является патогенетически обоснованным подходом для дальнейшего изучения центральных механизмов регуляции гомеостаза и их фармакологической коррекции

THE PATHOGENETIC RATIONALE THE WAYS OF EXPERIMENTAL TYPE 2 DIABETES MELLITUS MODELING

¹Natrus L.V., ¹Osadchuk Yu.S., ²Labudzynski D.O., ¹Chaikovsky Yu.B., ³Smirnov A.S.

¹Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

²Palladin Institute of Biochemistry, Kyiv, Ukraine

³Lugansk State Medical University, Rubizhne, Ukraine
Lnatrus777@gmail.com

Relevance. When modeling experimental type 2 diabetes mellitus (T2DM), various schools and research groups receive significant variability in tissue changes, which is difficult to compare and extrapolate as a specific pathogenic or pharmacological effect. The lack of standard operating procedures agreed upon in the scientific community greatly complicates the interpretation of the result. Therefore, the creation of a uniquely pathogenetic animal model of CD2 in animals is an urgent task.

Objective. Determination of the complex of exogenous effects for the most efficient reproduction of the experimental model of T2DM in rats and the pathogenetic justification of the changes in the body to study the central mechanisms of homeostasis regulation and their pharmacological correction.

Materials and methods. T2DM was model in rats by feeding a high-fat diet (HFD) with additional streptozotocin induction. The model was evaluated by anthropometric measurements, studies of biochemical parameters, an insulin tolerance test, analysis of the spectrum of fatty acids in the composition of tissues. Statistical data processing was performed with using the IBM SPSS Statistics 23.

Results. The obtained data were compared with our studies of the lipid metabolism of patients with varying degrees of diabetic retinopathy on the background of T2DM and analysis of the information content of biochemical markers to assess lipid metabolic disturbances on the background of hyperglycemia in patients. It was found that the simulation in rats of experimental T2DM by a food load of HFD (45%) + fructose 20% for 3 months followed by a single induction of streptozotocin (25 mg/kg) causes changes in lipid and carbohydrate metabolism in animals similar changes which are in the human with a diagnosed long-term diabetes and the development of microvascular complications.

Conclusion. We determined the optimal combination of effects and developed a consistent experimental load scheme that allows us to obtain a symptom model of type 2 diabetes in an animal experiment. Using the diagnostic algorithm, which includes physiological and laboratory methods, the degree of damage to organs and systems was determined, a comparison was made with the level of metabolic disorders in patients with T2DM and people without diabetes. The given model is a pathogenetically grounded approach for further study of the central mechanisms of homeostasis regulation and their pharmacological correction

Keywords: streptozotocin, fatty acids, high-fat diet, insulin resistance