DOI: <https://doi.org/10.32345/2664-4738.3-4.2019.09>

УДК 617.52 / 53-002.36-089.816

ЛІКУВАННЯ ФЛЕГМОН ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ДРЕНАЖУ З ПОСТІЙНИМ ЗНИЖЕННЯМ ВІД'ЄМНИМ ТИСКУ

¹Маланчук В.О. (<https://orcid.org/0000-0001-8111-0436>)²Сидоряко А.В. (<https://orcid.org/0000-0002-2708-6620>)¹Кульбашина Я.А. (<https://orcid.org/0000-0002-2571-091X>)¹Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна²Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», Запоріжжя, Україна
andrey.sidoryako19@gmail.com

Актуальність. При лікуванні гнійних ран щелепно-лицьової ділянки аспірація екссудату нерідко є неефективною через присмоктуючо-обструктивний ефект. Тому пошук способів удосконалення дренирування ран є актуальним при лікуванні хворих флегмонами всіх глибоких просторів щелепно-лицьової ділянки, включаючи клітковину шийного судинно-нервового пучка.

Мета: підвищити ефективність дренирування флегмон щелепно-лицьової ділянки та шиї за допомогою дренажу зі сталим від'ємним тиском.

Матеріали та методи. У щелепно-лицьовому відділенні Миської лікарні екстреної і швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя проліковано 100 осіб у віці 20-80 років з флегмонами щелепно-лицьової ділянки. У 1 групі (45 осіб) лікування проводилось за традиційним методом. У 2 групі (55 осіб) традиційне лікування доповнено дренируванням гнійної рани сталим зниженням тиском на стадії екссудації. Для цього у 2 групі застосували пристрій, форма якого повторювала форму гнійної порожнини. Його виготовляли індивідуально, відповідно до відбитку порожнини гнійної рани пацієнта, що зменшило вірогідність виникнення пролежнів в рані. При установці дренажу обмежувач занурення покривали герметизуючою мазевою речовиною на жировій основі. Пристрій виготовляли з медичної пластмаси з наскрізною пористістю, розмір каркаса менше щодо обсягу порожнини гнійної рани на 10-30 %, розміри отворів стінки каркаса складають 0,1-0,5 мм. Проводили математичні розрахунки ефективності аспірації екссудату. Число отворів тіла дренажу зі стінками рани в одному квадратному сантиметрі рани складало 200 шт, при ефективній швидкості 0,2 м/с та об'ємі евакуації 150 мл/хв. Це виключає присмоктуючо-обструктивний ефект.

Результати. Термін перебування хворих 2 групи у стаціонарі скоротився у порівнянні з пацієнтами 1 групи. Поліпшення клінічної картини і стабілізація загального стану у 53 (96,4 %) хворих 2 групи спостерігалися на 3 добу після операції, а у 43 (95,6 %) пацієнтів 1 групи – на 4-5 добу. Крім того, у них зменшилася інтенсивність больового синдрому на 4-5 добу. У 48 (87,3 %) пацієнтів 2 групи гноетеча припинялася вже на 2-3 добу і з'являлися грануляції – на 3-4 добу, а повне очищення і зближення країв рани – на 6-8 добу. У 4 пацієнтів 1 та 2 груп терміни загоєння післяопераційної рани були більш тривалими: припинення гнійних виділень у них відзначалося до 6-7 діб, поява грануляцій – до 7-8 діб, повне очищення і крайове зближення рани – до 10-12 діб. Також у 2 групі було менше ускладнень, пролежнів в рані від трубчастого дренажу і менше поширення запального процесу в сусідні тканини простору.

Висновки. Дренирування гнійних ран зниженням від'ємним сталим тиском забезпечує підвищення ефективності евакуації екссудату; зменшення кількості ускладнень; прискорення настання другої фази запального процесу.

Ключові слова: активний дренаж, флегмони щелепно-лицьової ділянки, щелепно-лицьова хірургія.

Актуальність. Проблема адекватного дренирування рани після розтину запального інфільтрату особливо актуальна при лікуванні хворих флегмонами глибоких просторів щелепно-лицьової ділянки [2, 6]. Однак, при лікуванні гнійних ран застосування методу класичного короткотермінової аспірації постійним зниженням тиском може бути неефективним за рахунок присмоктувально-обструктивного ефекту. Зазначене вище вказує на необхідність вдосконалення способів і пристроїв для аспірації екссудату у щелепно-лицьовій хірургії [4].

У клінічну практику щелепно-лицьових хірургів упроваджено різні способи лікування гнійно-запальних процесів, зокрема із застосуванням анти-

септичних препаратів, мазевих композицій, гіпербаричної оксигенації, низькочастотного ультразвуку, лазерного опромінення. Незважаючи на досягнуті успіхи, кількість загрозливих для життя пацієнтів ускладнень не зменшується. Серед них: медіастиніт, сепсис, менінгіт, тромбоз кавернозного синуса та інші. У зв'язку з цим розробка нових способів і пристроїв для лікування гострих гнійно-запальних процесів щелепно-лицьової ділянки є однією з актуальних завдань щелепно-лицьової хірургії [3, 5].

Мета дослідження: підвищити ефективність дренирування клітинних просторів при флегмонах щелепно-лицьової ділянки та шиї за допомогою дренажу з постійним зниженням тиском.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Всі процедури, що проводяться в дослідженні за участю пацієнтів, відповідали етичним стандартам інституційного та національного дослідницького комітету, а також Гельсінкської декларації 1975 року та її перегляду у 1983 році.

У щелепно-лицьовому відділенні Міської лікарні екстреної і швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя комплексно проліковано 100 осіб з флегмонами щелепно-лицьової ділянки, які перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні щелепно-лицьової хірургії. Хворі були розподілені на 2 групи: у першій (45 осіб) лікування проводилось за традиційним методом; у другій (55 осіб) традиційне лікування доповнено активним дрениванням гнійної рани сталим зниженим тиском на стадії ексудації. Для цього у другій групі був застосований пристрій, який забезпечував постійний знижений тиск у рані.

При надходженні в стаціонар всім хворим виконувалося комплексне обстеження. Оперативне втручання проводили за загальноприйнятою методикою під місцевою анестезією або загальним знеболенням в залежності від поширеності запального процесу.

З метою забезпечення фізіологічності загоєння рани для дренивання застосували пристрій, форма якого повторювала форму гнійної порожнини. Його виготовляли індивідуально відповідно до відбитку порожнини гнійної рани пацієнта, що зменшило вірогідність виникнення пролежнів в рані. При установці дренажу обмежувач занурення покривали мазевую речовиною на жировій основі, яка служили герметизуючою ланкою даного пристрою. Пристрій виготовляли з медичної пластмаси з наскрізною пористістю, розмір каркаса менше щодо обсягу порожнини гнійної рани на 10-30 %, розміри отворів стінки каркаса складають 0,1-0,5 мм. Проводили математичні розрахунки ефективності аспірації ексудату по формулі Пуазейля:

$$Q = \frac{V}{t} = \int_0^R v 2\pi r dr = \pi \frac{\Delta P}{8\eta l} R^4$$

Формула Пуазейля вказує, що густина рідини визначається за вимірами її витрати – Q, різниці тиску – P, довжини каркасу – l та його радіусу – R, площі $\pi d^2/4$ (м²), інтервалу часу заміру t, V – середньої по перетину швидкості, π – 3,14.

Аналіз каркасно-утримуючих властивостей дренажу до 70 % пористості виявив, що число отворів тіла дренажу зі стінками рани в одному квадратному сантиметрі рани склало 200 шт, при ефективній швидкості 0,2 м/с та об'ємі евакуації 150 мл/хв. Це виключає присмоктуючо-обструкційний ефект.

Гідродинамічне моделювання довело ефективність ламінарного плину ексудату з тіла дренажу та лінійний характер розподілу негативного тиску

при його сталих показниках у рані 12-15 мм Hg і розташуванням отворів на поверхні пристрою, що контактує з тканинами (рис. 1). Додатково пристрій має обмежувач занурення в рану, на якому розташований відповідний патрубок.

Кількість отворів на 1 см² площі їх розташування розраховували на основі того, що, згідно з анатомічною будовою, капіляри в поперечно-смугастих м'язах мають просвіт 5-6 мкм. Саме від цих показників залежить характер пористості пристрою для дренивання. Визначено, що оптимальний розмір отворів повинен бути в межах 0,1-0,5 мм. Отвори такого діаметру забезпечують достатній відвід ексудату і перешкоджають проростанню капілярів у просвіти. Крім того, фізіологічно не доцільно робити отвори менші за 0,5 мм.

Необхідно врахувати, що кров'яний тиск в прекапілярах грає важливу роль у виборі величини зниження тиску, тому у пристрої він не повинен перевищувати тиск у капілярах рани. Середня величина кров'яного тиску в капілярах відрізняється відносною стабільністю; зокрема на артеріальних відрізках капілярів великого кола кровообігу він становить 30-50 мм Hg, а на венозних відрізках в зв'язку з витратою енергії на подолання опору по довжині капіляра і фільтрацію – знижується до 25-15 мм Hg. Істотний вплив на капілярний кров'яний тиск і його динаміку надає величина венозного тиску. Тому тиск в рані знижували до 15 -12 мм Hg під контролем апарату створення негативного тиску (рис. 2).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Першу групу пацієнтів лікували за традиційною методикою хірургічного втручання, дренивання та медикаментозної терапії. Для пацієнтів другої групи запровадили дренивання ран постійним зниженим тиском. Спостереження показали позитивну динаміку клінічного перебігу флегмон при лікуванні хворих другої групи з додатковим до основного методу лікування дрениванням ран зниженим тиском. Термін перебування хворих другої групи у стаціонарі скоротився у порівнянні з пацієнтами першої групи. Результати динаміки клінічного перебігу одонтогенних флегмон у досліджуваних пацієнтів представлені у таблиці.

За нашими даними, поліпшення клінічної картини і стабілізація загального стану у 53 (96,4 %) хворих другої групи спостерігалися на третю добу після операції, а у 43 (95,6 %) пацієнтів першої групи – на 4-5 добу (табл.). Крім того, у них зменшилася інтенсивність больового синдрому в середньому на 4-5 добу. У 48 (87,3 %) пацієнтів другої групи гноєтеча припинялася вже на 2-3 добу і з'являлися грануляції – на 3-4 добу, а повне очищення і зближення країв рани – на 6-8 добу. У 4 пацієнтів пер-

шої та другої груп терміни загоєння післяопераційної рани були більш тривалими: припинення гнійних виділень у них відзначалося до 6-7 доби, поява грануляцій – до 7-8 діб, повне очищення і крайове зближення рани – до 10-12 діб.

Для підвищення ефективності дренування рани запропоновано дренажний пристрій, який складається із стандартного та індивідуального компо-

Рис. 1. Дренажний пристрій:

1. Пристрій з медичної пластмаси для збереження об'єму порожнини; 2. Обмежувач занурення у внутрішньотканинну порожнину; 3. Відвідний патрубок для відтоку ексудату

Рис. 2. Апарат для створення негативного тиску

ненту, виготовленого з медичної пластмаси «Суперакріл», який не подразнює м'які тканини рани, є нетоксичним для організму пацієнта, має достатню міцність, не деформується і не змінює обсягу в процесі використання пристрою при зміні температури тіла, зберігає гладку поверхню; має незначну теплопровідність для збереження постійної температури м'яких тканин каркаса, легко дезінфікується, має невелику питому вагу. Кожен раз при використанні цього пристрою його моделюють індивідуально, що забезпечує відповідність стінок порожнини і попереджає менший відсоток виникнення пролежнів.

Час видалення дренажного пристрою з тканин у пацієнтів був обумовлений як суб'єктивними даними, зокрема: поліпшення самопочуття після розтину флегмони, нормалізувався процес вживання їжі, припинялися болі, так і об'єктивними: відсутні клінічні дані щодо поширення запального процесу в сусідні анатомічні простори; очищення рани спостерігалось на 2-3 добу, вона покривалася фібрином, на дні з'являлася грануляційна тканина. Необхідно відзначити, що у другій групі грануляція переважно вкривала все дно рани. Важливим показником виявився розрахунок обсягу (V) гнійної порожнини, який визначався за відбитком і розраховувався за допомогою формули $V = \pi r^2 h$. Після підрахунків середній обсяг гнійної порожнини становив приблизно 10,5 см³. Через 3 доби виміри повторювали і констатували, що обсяг гнійної порожнини зменшувався у другій групі приблизно на 30 %. На четверту добу, коли серозного ексудату вже не спостерігалось, апарат знімали. Епітелізація країв поверхні рани проходила поступово. Вже на 2 добу після початку лікування було відзначено, що у пацієнтів знизилася температура тіла до 37,0°С, в загальному аналізі крові відзначалося поступове зменшення кількості лейкоцитів в середньому до $10-12 \cdot 10^9$, показники ШОЕ зменшувалися повільніше і залишалися вище нормальних навіть перед випискою хворого зі стаціонару (20-27 мм / год).

При цитологічному дослідженні рани при своєчасному лікуванні флегмон на третю добу відзначалася інтенсивна міграція лейкоцитів (від 40 до 120 в полі зору), були присутні нейтрофіли і зустрічалися також епітеліальні клітини в малій кількості.

Таблиця

Порівняльна характеристика клінічних показників у хворих на флегмони щелепно-лицьової ділянки

Показники	1 група (n=45) – пасивне дренування	2 група (n=55) – активне дренування
Поліпшення загального стану, суб'єктивно (діб)	3,7 ± 0,6	2,4 ± 0,7
Зменшення болювого синдрому, суб'єктивно (діб)	3,2 ± 0,4	2,5 ± 0,8
Зменшення ексудації (діб)	4,2 ± 0,7	2,4 ± 0,6*
Поява грануляцій (діб)	4,5 ± 0,9	3,2 ± 0,5*
Повне очищення рани (діб)	11,2 ± 0,8	6,2 ± 0,7*

Примітка: * – статистично достовірні відмінності від контрольної групи (p<0,05)

Рис. 3. Графік порівняння динаміки зміни розмірів запальних інфільтратів двох груп хворих

Спостерігали зменшення розмірів запального інфільтрату у динаміці. Для оцінки динаміки запального процесу у хворих флегмони щелепно-лицьової ділянки [3] використовували спосіб, який забезпечує спрощення контролю при збереженні достовірності результатів.

Аналіз даних дослідження та результати порівняння на графіку засвідчив зменшення обсягу і величини інфільтрату по периферії рани в другій групі хворих у порівнянні з першою (рис. 3).

Проте, у деяких пацієнтів (4 з двох груп) запальний процес не зупинився в первинних межах, що відображено на графіку як відхилення в бік збільшення отриманої кривої від нормального перебігу в середньому на 5-8 сантиметрів. У них діагностували розвиток ускладнень і коректували тактику лікування, а саме: міняли препарати для антибактеріальної терапії та проводили додаткові оперативні втручання з приводу розкриття нових просторів і ревізії вже відкритих порожнин за класичною методикою. При використанні запропонованого пристрою пролежнів від його контурів не відзначено.

ВИСНОВКИ

Дренування післяопераційних ран при гнійно-запальних процесах щелепно-лицьової ділянки постійним зниженим тиском за допомогою запропонованого пристрою забезпечує: підвищення ефективності евакуації ексудату з рани, що сприяє позитивному перебігу активної фази запального процесу та усуває необхідність повторних перев'язок; зменшення кількості ускладнень, зокрема поширення запального процесу в сусідні міжклітинні простори та виникнення пролежнів в рані; прискорення настання другої фази запального процесу, скорочення термінів перебування у стаціонарі майже у два рази, пришвидшенням позитивної динаміки перебігу захворювання.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що не мають конфлікту інтересів, який може сприйматися таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.

Джерело фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної підтримки.

REFERENCES

1. Malanchuk V.A., Sidoryako A.V. [A method for evaluating the dynamics of the inflammatory process in patients with phlegmon of the maxillofacial area] / Patent No. 135040 Ukraine. IPC A61B 5/00, A61B 5/103. No. u2019 00530; Appl. 18 Jan. 2019; Published 10. 06. 2019, Bulletin No. 11. [in Ukrainian]
2. Burnside V., Glasgow M., Ugurluoglu R. Vacuum-assisted closure in the treatment of craniofacial injuries // J. Oral. Maxillofac. Surg. 2010; 68 (4): 935-42. <https://doi.org/10.1016/j.joms.2009.09.113>.
3. Benevides B.S., Batista H.M.T., Sousa Lopes M.C.M. et al. Descending Necrotizing Mediastinitis due to Odontogenic Infection: An unusual Case Report // MOJ Surg. 2017; 4 (6): 139-41. DOI: 10.15406/mojs.2017.04.00094. Access mode: <http://medcraveonline.com/MOJS/MOJS-04-00094.pdf>.
4. Rocha F.S., Batista J.D., Silva C.J., Junior R.B., Raposo L.H.A. Considerations for the spread of odontogenic infections – diagnosis and treatment // Oral and Maxillofacial Surgery. 2015; 2, Ch.16: 341-58. <https://doi.org/10.5772/59161>
5. Yoshimoto A., Inoue T., Fujisaki M. Morizumi S., Suematsu Y. Efficacy of vacuum-assisted closure therapy on rehabilitation during the treatment for surgical site infection after cardiovascular surgery // General Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2016; 64 (8): 464-9. <https://doi.org/10.1007/s11748-016-0664-x>.
6. Asher S.A., White H.N., Golden J.B., Magnuson J.S., Carroll W.R., Rosenthal E.L. Negative pressure wound therapy in head and neck surgery // JAMA Facial Plast. Surg. 2014; 16 (2): 120-6. <https://doi.org/10.1001/jamafacial.2013.2163>.

Отримано: 10.12.2019

ЛЕЧЕНИЕ ФЛЕГМОН ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С ПОМОЩЬЮ ДРЕНАЖА С ПОСТОЯННЫМ СНИЖЕННЫМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

¹Маланчук В.А., ²Сидоряка А.В., ¹Кульбашина Я.А.

¹ «Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца», Киев, Украина

²Государственное Учреждение «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», Запорожье, Украина
andrey.sidoryako19@gmail.com

Актуальность. При лечении гнойных ран челюстно-лицевой области аспирация экссудата нередко является неэффективной из-за присасывающего обструктивного эффекта. Поэтому поиск способов совершенствования дренирования ран актуально при лечении больных флегмонами всех глубоких пространств челюстно-лицевой области, включая клетчатку шейного сосудисто-нервного пучка.

Цель: повысить эффективность дренирования флегмон челюстно-лицевой области и шеи с помощью дренажа с постоянным отрицательным давлением.

Материалы и методы. В челюстно-лицевом отделении Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи г. Запорожье пролечено 100 человек в возрасте 20-80 лет с флегмонами челюстно-лицевой области. В 1 группе (45 человек) лечение проводилось по традиционному методу. Во 2 группе (55 человек) традиционное лечение дополнено дренированием гнойной раны постоянным пониженным давлением на стадии экссудации. Для этого во 2 группе применили устройство, форма которого повторяла форму гнойной полости. Его изготавливали индивидуально, в соответствии с отпечатком полости гнойной раны пациента, что уменьшило вероятность возникновения пролежней в ране. При установке дренажа ограничитель погружения покрывали герметизирующей мазью на жировой основе. Устройство изготавливали из медицинской пластмассы со сквозной пористостью, размер каркаса меньше по объему полости гнойной раны на 10-30%, размеры отверстий стенки каркаса составляют 0,1-0,5 мм. Проводили математические расчеты эффективности аспирации экссудата. Число отверстий тела дренажа со стенками раны в одном квадратном сантиметре раны составило 200 шт, при эффективной скорости 0,2 м/с и объеме эвакуации 150 мл/мин. Это исключает присасывающий обструктивный эффект.

Результаты. Срок пребывания больных 2 группы в стационаре сократился по сравнению с пациентами 1 группы. Улучшение клинической картины и стабилизация общего состояния у 53 (96,4%) больных 2 группы наблюдались на 3 сутки после операции, а у 43 (95,6%) пациентов 1 группы – на 4-5 сутки. Кроме того, у них уменьшилась интенсивность болевого синдрома на 4-5 сутки. У 48 (87,3%) пациентов 2 группы гноетечение прекращалось уже на 2-3 сутки и появлялись грануляции – на 3-4 сутки, а полное очищение и сближения краёв раны – на 6-8 сутки. У 4 пациентов 1 и 2 групп сроки заживления послеоперационной раны были более длительными: прекращение гнойных выделений у них отмечалось к 6-7 суткам, появление грануляций – к 7-8 суткам, полная очистка и краевое сближения раны – к 10-12 суткам. Также во 2 группе было меньше осложнений, пролежней в ране от трубчатого дренажа и меньшее распространение воспалительного процесса в соседние ткани пространства.

Выводы. Дренирование гнойных ран пониженным видеёмным постоянным давлением обеспечивает повышение эффективности эвакуации экссудата; уменьшение количества осложнений; ускорения наступления второй фазы воспалительного процесса.

Ключевые слова: активный дренаж, флегмоны челюстно-лицевой области, челюстно-лицевая хирургия

TREATMENT OF PHLEGMONS OF THE MAXILLOFACIAL AREA BY AUXILIARY DRAINAGE WITH CONSTANT REDUCED NEGATIVE PRESSURE

¹Malanchuk V.A., ²Sidoryako A.V., ¹Kulbashna Ya. A.

¹National O.O. Bogomolets Medical University, Kyiv, Ukraine

²Governmental Institution «Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education», Zaporizhzhia, Ukraine

Relevance. In the treatment of purulent wounds of the maxillofacial area, aspiration of the exudate is often ineffective due to the aspirational-obstructive effect. Therefore, the search for ways to improve wound drainage is relevant in the treatment of patients with phlegmons of all deep spaces of the maxillofacial area, including the fiber of the cervical neurovascular bundle.

Objective: To increase the efficiency of drainage of the phlegmons of the maxillofacial area and neck with the help of drainage with constant negative pressure.

Materials and methods. In the maxillofacial department of the City hospital of emergency and urgent medical care in Zaporizhzhia, 100 people aged 20-80 years were treated with phlegmons of the maxillofacial area. In one group (45 people), treatment was performed according to the traditional method. In group 2 (55 people), traditional treatment was supplemented by drainage of purulent wound with sustained reduced pressure at the exudation stage. To do this, in group 2 we used a device which shape was similar to the shape of a purulent cavity. It was made individually according to the imprint of the patient's purulent wound cavity, which reduced the likelihood of pressure sores in the wound. At installation of drainage the immersion limiter was covered with a sealing oily substance on a fat basis. The device was made of medical plastic with a through sponginess, the size of the frame was smaller than the capacity of the purulent wound cavity by 10-30%. The sizes of the openings of the frame wall were 0.1-0.5 mm. Mathematical calculations of the efficiency of exudate aspiration were conducted. The number of openings of the drainage body with the walls of the wound was 200 in one square centimeter, at an effective speed of 0.2 m/sec and an evacuation volume of 150 ml/min. This allowed to eliminate the aspirational-obstructive effect.

Results. The duration of hospitalization of the 2 group patients was shortened in comparison with patients of the 1 group. Improvement of the clinical picture and stabilization of the general condition in 53 (96.4%) patients of the 2 group were observed at 3 day after surgery, and the same indicators in 43 (95.6%) patients of the 1 group were observed at 4-5 day. In addition, it was decrease of the pain intensity at 4-5 day. In 48 (87.3%) patients of the 2 group, purulent exudation was stopped at 2-3 days, granulations appeared at 3-4 day, and the complete clearance and marginal closure of the wound were observed at 6-8 day. In 4 patients of the 1 and 2 groups, the healing time of the postoperative wound was longer: termination of purulent discharge was observed up to 6-7 days, appearance of granulations – up to 7-8 days, complete clearance and marginal closure of the wound – up to 10-12 days. Also, in the 2 group, there were fewer complications, pressure sores in the wound from tubular drainage and less spread of the inflammatory process in adjacent tissues of space.

Conclusions. Drainage of purulent wounds with constant reduced negative pressure increases the efficiency of exudate evacuation; reducing the number of complications; acceleration of the onset of the second phase of the inflammatory process.

Key words: active drainage, phlegmons of maxillofacial area, maxillofacial surgery.