ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛИШКОВОЇ РАНОВОЇ ПОРОЖНИНИ НА БАЛІСТИЧНОМУ ПЛАСТИЛІНІ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАНДАРТНИХ ТА ЕКСПАНСИВНИХ КУЛЬ

¹Лурін І.А. <https://orcid.org/0000-0001-6280-1725>²Цема Є.В. <https://orcid.org/0000-0002-1178-7529>³Гуменюк К.В. <https://orcid.org/0000-0001-8892-4061>²Сусак Я.М. <https://orcid.org/0000-0002-5102-485X>²Дубенко Д.Є. <https://orcid.org/0000-0002-3016-0799>⁴Цема Є.Є. <https://orcid.org/0000-0002-6555-451X>¹Національна академія медичних наук України, Київ, Україна²Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна³Українська військово-медична академія, Київ, Україна⁴Національний авіаційний університет, Київ, Україна

hemorrhoid@ukr.net

Актуальність. Локальні збройні конфлікти останніх десятиліть по всьому світу характеризуються використанням експансивних куль, що є черговим викликом перед військовими хірургами. Тому актуальним є проведення експериментальних досліджень, спрямованих на вивчення балістичних властивостей різних видів боєприпасів та особливостей спричинених ними уражень у поранених. Моделювання вогнепального ранового каналу є невід'ємним етапом вивчення механізму утворення вогнепальних поранень і є предметом дослідження ранової балістики.

Ціль: розробити експериментальну модель для балістичної імітації пластичної деформації біологічних тканин, спричинену дією експансивних та неекспансивних куль.

Матеріали та методи. Дослідження проведені на 40 блоках балістичного пластиліну, в кожен з яких виконували по одному пострілу з вогнепальної автоматичної стрілецької зброї АКС-74 та карабіну ZBROYAR Z-10. В залежності від виду боєприпасів блоки балістичного пластиліну були розподілені на 4 групи: група I – 10 блоків, в які проводилися постріли неекспансивними військовими патронами 5,45 мм з кулями «ПС» зі сталевим осердям «7Н6»; група II (10 блоків) – патрони 5,45х39 мм з експансивними кулями «V-Max»; група III (10 блоків) – патронами 7,62х39 мм; група IV (10 блоків) – патрони 7,62х39 мм з експансивними кулями типу «SP».

Результати. Встановлено, що при використанні неекспансивних куль зовнішня площа вхідного отвору кульового кореляє з калібром снаряда (в 1,6 рази більше, ніж при використанні куль 7,62 мм). Для експансивних куль калібр снаряда достовірно не впливає на площу вхідного отвору ($P < 0,05$). Експансивні властивості кулі достовірно збільшують площу кульового отвору в 14,87-31,2 рази порівняно з неекспансивними боєприпасами. Збільшення калібру неекспансивної кулі призводить до значного збільшення площі сагітального перерізу залишкової ранової порожнини в 1,59-2,03 рази; Експансивні властивості куль різних калібрів можуть по різному впливати на об'єм залишкової ранової порожнини: для куль 5,45 мм залишкова ранова порожнина збільшується у 1,49 рази, для куль 7,62 мм – зменшується у 1,65 рази.

Висновки. Вид стрілецької зброї, калібр патрону, його експансивні властивості впливають на просторову конфігурацію основних балістичних показників, що виникають в запропонованій моделі пластичної деформації м'яких тканин. Використання експансивних куль призводить до формування більшого обсягу незворотних пошкоджень за рахунок пластичної деформації порівняно з неекспансивними аналогами.

Ключові слова: експансивна куля, ранова балістика, пластична деформація, вогнепальне поранення, рановий канал.

Актуальність. Моделювання вогнепального ранового каналу є важливим етапом вивчення механізму утворення вогнепальних поранень і є одним з основних завдань ранової балістики [1, 2]. Локальні збройні конфлікти останніх десятиліть по всьому світу свідчать, що використання сучасної вогнепальної зброї та набоїв до неї кардинально змінило характер отриманих поранень і структуру санітарних втрат. Застосування нових видів озброєння призвело до збільшення кількості множинних, поєднаних та комбінованих поранень [3]. Сучасні вогнепальні поранення мають виражені морфо-функціональні зміни і характеризуються тяжкістю, множинними, поєднаними та комбінованими ушкодженнями [3]. Травма-

тичні ефекти вогнепальних пошкоджень для людей не можуть бути перевірені *in vivo*, а тому потрібно використовувати надійні імітатори біологічних тканин. Найбільшого визнання серед імітаторів отримали 10% та 20% водні розчини желатину у вигляді гелю, гліцеринове мило і балістичний пластилін [2, 4]. Проведення таких досліджень дозволяє дослідити особливості формування ранового каналу [5, 6, 7]. А отже, потреба у більш поглибленому вивченні цих об'єктів стосується не лише криміналістики та судово-медичної експертизи, а й пересікається з хірургічною наукою в аспекті вивчення сучасних вогнепальних поранень, отриманих в локальних збройних конфліктах та у цивільних сутичках. Пошук глибиною 20

років в міжнародних наукометричних базах не виявив фундаментальних експериментальних досліджень по рановій балістиці пластичної деформації м'яких тканин з моделюванням залишкової ранової порожнини, утвореної кулями з експансивними властивостями.

Ціль: розробити експериментальну модель пластичної деформації для визначення характеристик ранового каналу та залишкової ранової порожнини, спричинену дією експансивних та неекспансивних куль.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Експериментальне дослідження було проведене на базі тиру Київського наукового-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за участі фахівців Державного наукового-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. В якості балістичного матеріалу, як імітатора компоненту пластичної деформації біологічних тканин, використовували спеціальний сертифікований балістичний пластилін (ROMA PLASTILINA №.1, Ballistic Testing Backing Material, USA)

Задля досягнення поставленої перед експериментальним дослідженням мети проводили балістичні дослідження з використанням 40 блоків балістичного пластиліну у формі паралелепіпеда розмірами (40,0x24,0x28,0 см), в кожен з яких виконували по одному пострілу з вогнепальної автоматичної стрілецької зброї АКС-74 та карабіну ZBROYAR Z-10 з оптичним прицілом, з відстані 25 м.

Експеримент проводились за нормальних умов навколишнього середовища (температура 25°C, відносна вологість 72%, атмосферний тиск 738 mm Hg). Блоки балістичного пластиліну перед пострілом розігрівались до температури 30°C. В залежності від виду боєприпасів, які використовувались для експериментального моделювання пластичної деформації біологічних тканин, блоки балістичного пластиліну були розподілені на 4 групи: 1 група – 10 блоків, в які проводилися постріли неекспансивними військовими патронами 5,45 мм з кулями «ПС» зі сталевим осердям «7Н6»; 2 група – 10 блоків, в які проводилися постріли з використанням патронів 5,45x39 мм

споряджених експансивними кулями типу «V-Max»; 3 група – 10 блоків, в які стріляли неекспансивними патронами 7,62x39 мм; 4 група – 10 блоків, в які проводилися постріли патронами 7,62x39 мм спорядженими експансивними кулями типу «SP». Таким чином, всього проведено 40 пострілів – по 10 пострілів кожним видом кулі (рис. 1).

Після виконання пострілів проводили планіметричні дослідження конфігурації кульового отвору: оцінювали периметр та площу кульового отвору, а також розраховували коефіцієнт розривної дії снаряду (співвідношення периметру ранового отвору до його площі). Планіметричні коефіцієнти обчислювали програмним шляхом з використанням програмного продукту «ImageJ», розробленим National Institutes of Health by an employee of the Federal Government (Bethesda, Maryland, USA), яке розповсюджується на умовах вільного доступу за посиланням <https://imagej.nih.gov/ij/>. З використанням комп'ютерного аналізу розраховували наступні планіметричні параметри: зовнішній периметр кульового отвору; внутрішній периметр кульового отвору; зовнішню площу кульового отвору; внутрішню площу кульового отвору; коефіцієнт розривної дії снаряду (коефіцієнт площа/периметр) розраховувався, як співвідношення периметру кульового отвору до його площі.

Після завершення планіметричних вимірювань отриманого після пострілу блоку балістичного пластиліну – у вхідний отвір заливали рідкий пластик «Силіконполісистем» (Rubber Silicone Liquid, Germany), який має властивість ущільнюватися, приймаючи відповідну форму в середині балістичного пластиліну. Через 30 хвилин рідкий пластик після заливання стає щільним. До складу рідкого пластику входять два компоненти: А та В, які перед заливанням змішували у співвідношенні 1:1, ретельно перемішували вручну 40 секунд до отримання однорідної маси, при температурі 22-25°C, після чого розчин був готовий до використання. Для більш наочної візуалізації експансивних характеристик куль – до пластичної маси додавали барвник різного кольору: зеленого кольору – для куль з експансив-

Рис. 1. Вхідні кульові отвори від пострілів: А) патроном 5,45x39 мм спорядженого експансивними кулями типу «V-Max»; Б) неекспансивним військовим патроном 5,45 мм з кулями «ПС» зі сталевим осердям «7Н6»; В) патроном 7,62 мм з експансивними властивостями. Наведені планіметричні показники вхідного кульового отвору, розраховані програмним шляхом

ними властивостями; червоного кольору – для куль без експансивних властивостей.

Утворені форми через 35 хвилин після структування очищували від балістичного пластиліну і виконували їх планіметричну оцінку в сагітальній проекції з використанням програмного забезпечення «ImageJ». Визначали наступні параметри залишкової ранової порожнини: максимальний периметр сагітальної проекції залишкової кульової порожнини; максимальну площу сагітальної проекції залишкової кульової порожнини; коефіцієнт розривної дії снаряду (коефіцієнт площа/периметр) – співвідношення периметру максимального сагітального січення до його площі;

Об'єм залишкової ранової порожнини розраховували шляхом занурення отриманого пластикового зліпку у посудину з водою – за об'ємом витісненої рідини в см³.

Статистична обробка отриманих даних проводилася з використанням параметричної статистики Student's t-test, різниця між групами вважалася достовірною при ймовірності статистичної похибки менше 5% ($P < 0.05$). Дескриптивна статистика наведена у вигляді групової середньої арифметичної величини (M) та її середньої похибки (m). Статистичний аналіз матеріалу проводили з використанням статистичного пакету Microsoft Excel 2010, Version 14.0.7268.5000 (Product Number 02260-018-0000106-48453).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

За результатами проведеного експериментального дослідження, нами було встановлено, що для кожної кулі була характерна своя форма та розміри вхідного та вихідного отвору на балістичному пластиліні. Так, лише для військового патрона калібром 5,45 мм з кулями «ПС» зі сталевим осердям «7Н6» (1 група), у всіх 10 спостереженнях були виявлені як вхідний, так і вихідний кульові отвори. Враховуючи те, що у інших групах експериментального дослідження (групи 2, 3 та 4) в жодному випадку вихідного кульового отвору не було (сліпе вогнепальне поранення) – ми не проводили детальної планіметричної оцінки вихідного кульового отвору, зосередившись лише на порівняльній характеристиці планіметричних параметрів вхідних кульових отворів в залежності від калібру кулі та наявності/відсутності в ній експансивних властивостей.

Оскільки при проходженні кулі 5,45 мм «ПС» через балістичний пластилін вона проходить на виліт – очевидно, що частина вихідної кінетичної енергії, якою володіє куля під час вистрілу, залишається з нею під час вильоту з блоку. Таким чином, загальна передана від кулі енергія до балістичного блоку буде найменшою при використанні табельних неекспансивних куль 5,45 мм «ПС», на відміну від усіх інших боєприпасів, що аналізувалися у представленому дослідженні.

Для усіх інших боєприпасів – патрони 5,45x39 мм з експансивними кулями типу «V-Max» (група 2); патрони 7,62x39 мм (група 3); патрони 7,62x39 мм з експансивними кулями типу «SP» (група 4), – були виявлені лише вхідні кульові отвори різної конфігурації, які представлені у таблиці 1. Такі особливості свідчили про наявність сліпого характеру ушкодження в результаті пластичної деформації балістичного пластиліну. За даними літератури, при таких пораненнях вся кінетична енергія передається від кулі в середину об'єкта пострілу, призводячи до значних незворотних руйнувань оточуючих тканин [1, 4-8]. Зазначений факт має важливе клінічне значення, оскільки при поступленні пораненого з ознаками такого ушкодження, хірург має усвідомлювати, що характер ушкоджень органів та тканин при сліпому пораненні буде значно більшим, ніж при наскрізному пораненні, за рахунок формування зон вторинного некрозу та молекулярного струсу (комоції) біологічних тканин. В свою чергу, від цього залежить швидкість та якість лікування пораненого, об'єм та тактика оперативного втручання. Найбільші вхідні кульові отвори спостерігалися при використанні експансивних патронів калібром 5,45 мм V-max (група 2) та 7,62 мм «SP» (група 4). Значно меншими були вхідні отвори при використанні неекспансивних куль відповідних калібрів.

З даних таблиці видно, що незалежно від калібру кулі – наявність в неї експансивних властивостей призводить до суттєвого збільшення як периметру, так і площі вхідного кульового отвору. Так, для куль калібру 5,45 мм зовнішня і внутрішня область були більшими в 24,58 та 31,2 рази, відповідно, у куль типу «V-max» з експансивними властивостями, порівняно з неекспансивним аналогом ($P < 0.001$). Відповідна тенденція спостерігалася і при планіметричному аналізі вхідного кульового отвору від куль 7,62 мм: зовнішня і внутрішня область були більшими в 14,87 та 21,0 рази, відповідно, у куль типу «SP» з експансивними властивостями ($P < 0,001$).

Аналогічна залежність простежувалася між наявністю у кулі експансивних властивостей та збільшенням периметру кульового отвору, хоча в кількісному аспекті такий взаємозв'язок був не настільки значним, як для аналогічного показника площі кульового отвору. Так, для куль калібру 5,45 мм зовнішній і внутрішній периметр були більшими в 4,84 та 6.53 рази, відповідно, у куль типу «V-max» з експансивними властивостями ($P < 0,001$). зовнішній і внутрішній периметр для куль 7,62 мм були більшими в 3,99 та 4,9 рази, відповідно, у куль типу «SP» з експансивними властивостями, порівняно з неекспансивним аналогом зазначеного калібру ($P < 0,001$).

Значно більшим коефіцієнт розривної дії кулі (коефіцієнт периметр/площа) був при використанні неекспансивних куль різного діаметру (від 2,54 до

Планіметричні характеристики вхідного кульового отвору та сагітальної проекції залишкової ранової порожнини в залежності від виду снаряду, що ранив

Тип кулі	Площа вхідного отвору ($M \pm m$, см ²)		Периметр вхідного отвору ($M \pm m$, см)		Зовнішній коефіцієнт периметр/площа	Внутрішній коефіцієнт периметр/площа	Сагітальний об'єм порожнини рани				Загальний об'єм порожнини рани, ($M \pm m$ см ³)
	Зовнішній край	Внутрішній край	Зовнішній край	Внутрішній край			Площа ($M \pm m$ см ²)	Периметр ($M \pm m$, см)	Окружність, см	Коефіцієнт периметр/площа	
Група 1: 5,45 mm «PS»	3,341 $\pm 0,29$	1,083 $\pm 0,15$	8,471 $\pm 0,91$	3,757 $\pm 0,48$	2,54	3,47	67,517 $\pm 8,52$	34,985 $\pm 3,75$	0,845	0,52	253,31 $\pm 15,8$
Група 2: 5,45 mm V-max	82,126 $\pm 7,40$	33,794 $\pm 2,94$	40,980 $\pm 5,72$	24,540 $\pm 2,21$	0,50	0,73	84,574 $\pm 8,04$	41,908 $\pm 4,21$	0,876	0,50	378,67 $\pm 32,5$
Група 3: 7,62 mm «PS»	5,359 $\pm 0,63$	1,426 $\pm 0,26$	12,968 $\pm 1,21$	6,208 $\pm 0,75$	2,42	4,35	137,054 $\pm 18,54$	55,786 $\pm 5,31$	0,769	0,41	852,18 $\pm 60,3$
Група 4: 7,62 mm «SP»	79,705 $\pm 0,85$	29,946 $\pm 3,89$	51,709 $\pm 5,69$	30,422 $\pm 3,16$	0,65	1,02	117,985 $\pm 13,81$	44,711 $\pm 4,38$	0,638	0,38	517,29 $\pm 44,9$
T1-2	10,64*	11,11*	5,61*	9,19*	-	-	1,46	1,23	-	-	3,47*
P1-2	<0,001*	<0,000*	0,000*	0,000*	-	-	0,162	0,235	-	-	0,003*
T1-3	2,91*	1,14	2,97*	2,73*	-	-	3,41*	3,20*	-	-	9,61*
P1-3	0,009*	0,268	0,008*	0,014*	-	-	0,003*	0,005*	-	-	<0,001*
T3-4	70,27*	7,32*	6,67*	7,45*	-	-	0,82	1,61	-	-	4,45*
P3-4	<0,001*	<0,001*	<0,001*	<0,001*	-	-	0,420	0,125	-	-	<0,001*
T2-4	0,33	0,79	1,33	1,53	-	-	2,09	0,46	-	-	2,50*
P2-4	0,749	0,440	0,200	0,145	-	-	0,051	0,650	-	-	0,022*

Примітки: T – Student's t-test; P – рівень суттєвості помилки; * – різниця на рівні значущості $P < 0,05$

4,35), тоді як для куль з експансивними властивостями зазначений показник становив лише 0,5-1,02. Це обумовлено тим, що експансивні кулі створюють вхідний кульовий отвір значно більшого діаметру в порівнянні з неекспансивними аналогами. Зазначену особливість необхідно враховувати при проведенні первинної хірургічної обробки вогнепальної рани: межа висічення некротичних тканин в ділянці вхідного кульового отвору від неекспансивних куль повинна мати циркулярний характер, тоді як при використанні противником експансивних куль – межі висічення некротичних тканин залежать від конкретної конфігурації кульового отвору та, як правило, мають неправильну форму із значним відступом від усіх країв ранового каналу.

Достовірної кореляції між площею та периметром вхідного кульового отвору та калібром куль з експансивними властивостями виявлено не було ($P > 0,15$). Тоді як для неекспансивних куль така закономірність була виявлена: зовнішній і внутрішній периметр вхідного кульового отвору був достовірно більшим (в 1,53 та 1,65 разів, відповідно) у куль 7,62 мм, порівняно з кулями 5,45 мм ($P < 0,014$).

Згідно з даними таблиці, в усіх чотирьох групах балістичних блоків мали місце достовірні відмінності загального об'єму залишкової ранової порожнини ($P < 0,022$). Збільшення калібру снаряду призводило до збільшення об'єму залишкової ранової порожнини незалежно від наявності чи відсутності експансивних властивостей кулі. Так, зі збільшенням калібру кулі від 5,45 мм до 7,62 мм для неекспансивних боеприпасів об'єм отриманих пластикових форм збільшився у 3,36 рази ($P < 0,001$), тоді як для експансивних куль відповідний показник збільшився в 1,37 рази ($P < 0,022$). За однакового калібру кулі спостерігалася двояка тенденція щодо зміни об'єму залишкової ранової порожнини. Так, при використанні куль 5,45 мм наявність експансивних властивостей куль викликало збільшення об'єму пластикової форми у 1,49 разів ($P = 0,003$). Тоді як при моделюванні ранового каналу, де використовувалися кулі 7,62 мм, була виявлена протилежна закономірність: у куль з експансивними властивостями об'єм залишкової ранової порожнини достовірно зменшився на у 1,65 разів ($P < 0,001$).

Для куль калібром 5,45 мм «V-max» (група 2) з експансивними властивостями збільшення ранового каналу обумовлене фрагментацією снаряду, що ранило, та спричиненням значної колатеральної пластичної деформації перивульнарних тканин, що призводить до значних радіарних розривів.

Важлива закономірність виявлена при порівнянні об'єму залишкової порожнини при пострілах кулями 7,62 мм: незважаючи на додаткові експансивні властивості куль «SP» (група 4), це не призводить до збільшення, а, навпаки, обумовлює суттєве зменшення ранової порожнини. Це пояснюється тим, що при наявності експансивних властивостей куль 7,62 мм менша частина кінетичної енергії кулі трансформується у незворотні руйнування біологічних тканин за рахунок пластичної деформації, що проявляється зменшенням об'єму ранового каналу в блоці балістичного пластиліну. Оскільки в обох групах куль 7,62 мм (групи 3 та 4) були лише сліпі ранові канали – очевидно, що загальна кількість кінетичної енергії, що передана від кулі біологічному імітатору, була рівною. Тому стає очевидним, що при використанні експансивних куль зазначеного калібру значно більша частина кінетичної енергії кулі йде на подолання еластичної деформації м'яких біологічних тканин та не призводить до миттєвого незворотного їх руйнування, а спричиняють формування зони вторинного некрозу та молекулярного стресу тканин, які є результатом існування тимчасової пульсуючої порожнини, яка за долю секунди формується в момент потрапляння снаряду в тканини. Зазначена обставина має важливе клінічне значення, оскільки при проведенні хірургічної обробки ран після дії експансивних куль 7,42 мм хірург повинен розуміти, що реальні масштаби uszkodження тканин і органів є значніші, ніж зона ранового каналу, яку він може візуалізувати при первинному хірургічному втручанні. Натомість, хірургічна тактика у таких поранених має бути спрямована на очікування формування значних зон вторинного перивульнарного некрозу та значних порушень репаративних властивостей рани за рахунок молекулярної комодії візуально здорових тканин.

Загальний вигляд отриманих пластикових форм після вогнепальних пострілів різними бойовими патронами представлений на рисунку 2.

Аналіз планіметричних параметрів сагітальної проекції залишкової ранової порожнини показав відсутність залежності периметру та площі зазначеної проекції пластикової форми від експансивних властивостей кулі. Лише для табельних боеприпасів без експансивних властивостей (групи 1, 3) було встановлено достовірне збільшення площі в 2,03 рази ($P = 0,003$) та периметру в 1,59 рази ($P = 0,005$) сагітальної проекції залишкової ранової порожнини зі збільшенням калібру кулі від 5,45 мм до 7,62 мм, що корелює з раніше викладеними міркуваннями

Рис. 2. Загальний вид отриманих пластикових форм ранових каналів та залишкової ранової порожнини при використанні куль різних калібрів, забарвлених в залежності від наявності чи відсутності експансивних властивостей снаряду, що ранило

стосовно закономірностей зміни загального об'єму пластикових форм.

Таким чином, за результатами проведених експериментальних досліджень з використанням балістичного пластиліну вдалося отримати модель сучасного вогнепального ранового каналу, спричиненого компонентом пластичної деформації ранових тканин, в залежності від калібру стрілецької зброї та експансивних властивостей сучасних куль. Отримані дані мають не лише теоретичне, а й практично-прикладне значення в клінічній роботі військових хірургів. Аналізуючи отримані дані, встановлені наступні закономірності. При використанні неекспансивних куль зовнішня площа вхідного кульового отвору корелює з калібром снаряду (в 1,6 рази більше при використанні куль 7,62 мм). Для експансивних куль калібр снаряду достовірно не впливає на площу вхідного кульового отвору ($P < 0.05$). Експансивні властивості кулі достовірно збільшують площу вхідного кульового отвору в 14,87-31,2 рази порівняно з неекспансивними боеприпасами; аналогічні залежності встановлені і для периметра вхідного кульового отвору. Збільшення калібру неекспансивної кулі призводить до значного збільшення площі сагітального перерізу залишкової ранової порожнини в 1,59-2,03 рази; тоді як експансивні властивості кулі достовірно не впливають ні на периметр, ні на площу сагітального перерізу залишкової ранової порожнини. Для неекспансивних куль обсяг залишкової ранової порожнини більшою мірою корелює з калібром кулі (збільшується у 3,36 рази); тоді як для експансивної кулі її калібр меншою мірою впливає обсяг залишкової порожнини (збільшується в 1,37 рази). Експансивні властивості кулі подвійно впливають на об'єм залишкової ранової порожнини: для куль 5,45 мм залишкова ранова порожнина збільшується в 1,49 рази, для куль 7,62 мм – зменшується у 1,65 рази. Використання експансивних куль 7,62

мм призводить до більшого колатерального пошкодження (зона вторинного некрозу, молекулярного струсу) за рахунок розсіювання кінетичної енергії кулі на еластичну деформацію перивульнарних тканин порівняно з неекспансивними аналогами. Використання експансивних куль 5,45 мм призводить до формування більшого обсягу незворотних пошкоджень за рахунок пластичної деформації, порівняно з неекспансивними аналогами.

ВИСНОВКИ

Вид стрілецької зброї, калібр патрону, експансивні властивості куль впливають на просторову конфігурацію основних балістичних показників, що виникають в запропонованій моделі пластичної деформації м'яких тканин. Використання експансивних куль призводить до формування більшого обсягу незворотних пошкоджень за рахунок пластичної деформації, порівняно з неекспансивними аналогами.

Конфлікт інтересів. Автори засвідчують відсутність фактичного або потенційного конфлікту інтересів щодо результатів цієї роботи.

REFERENCES

- Carr DJ, Stevenson T, Mahoney PF. The use of gelatine in wound ballistics research. *Int J Legal Med*. 2018 Nov;132(6):1659-1664. DOI: 10.1007/s00414-018-1831-7.
View at:
Publisher Site: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00414-018-1831-7>
PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29696465/>
PubMed Central: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6208714/>
- Humphrey C, Kumaratilake J. Ballistics and anatomical modelling – A review. *Leg Med (Tokyo)*. 2016 Nov;23:21-29. DOI: 10.1016/j.legalmed.2016.09.002.
View at:
Publisher Site: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1344622316300967?via%3Dihub>
PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27890098/>
- Pinto A, Russo A, Reginelli A, Iacobellis F, Di Serafino M, Giovine S, Romano L. Gunshot Wounds: Ballistics and Imaging Findings. *Semin Ultrasound CT MR*. 2019 Feb;40(1):25-35. DOI: 10.1053/j.sult.2018.10.018.
View at:
Publisher Site: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088721711830101X?via%3Dihub>
PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30686364/>
- Folio LR, Fischer TV, Shogan PJ, Frew MI, Kang PS, Bunker R, Provenzale JM. CT-based ballistic wound path identification and trajectory analysis in anatomic ballistic phantoms. *Radiology*. 2011 Mar;258(3):923-9. DOI: 10.1148/radiol.10100534.
View at:
Publisher Site: <https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.10100534>
PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21224425/>
- Stefanopoulos PK, Mikros G, Piniadis DE, Oikonomakis IN, Tsiatis NE, Janzon B. Wound ballistics of military rifle bullets: An update on controversial issues and associated misconceptions. *J Trauma Acute Care Surg*. 2019 Sep;87(3):690-698. DOI: 10.1097/TA.0000000000002290.
View at:
Publisher Site: https://journals.lww.com/jtrauma/Abstract/2019/09000/Wound_ballistics_of_military_rifle_bullets__An.29.aspx
PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30939579/>
- Stefanopoulos PK, Piniadis DE, Hadjigeorgiou GF, Filippakis KN. Wound ballistics 101: the mechanisms of soft tissue wounding by bullets. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2017 Oct;43(5):579-586. DOI: 10.1007/s00068-015-0581-1.
View at:
Publisher Site: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00068-015-0581-1>
PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26470704/>
- Stefanopoulos PK, Filippakis K, Soupiou OT, Pazarakiotis VC. Wound ballistics of firearm-related injuries--part 1: missile characteristics and mechanisms of soft tissue wounding. *Int J Oral Maxillofac Surg*. 2014 Dec;43(12):1445-1458. DOI: 10.1016/j.ijom.2014.07.013.
View at:
Publisher Site: [https://www.ijoms.com/article/S0901-5027\(14\)00263-X/fulltext](https://www.ijoms.com/article/S0901-5027(14)00263-X/fulltext)
PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25128259/>
- Tsema IeV, Bepalenko AA, Dinets AV, Koval BM, Mishalov VG. Study of damaging factors of contemporary war, leading to the limb loss. *Surgery News*. 2018; 26(3): 321-331. DOI: 10.18484/2305-0047.2018.3.321
View at:
Publisher Site: <http://www.surgery.by/details.php?&lang=ru&year=2018&issue=3&number=7>
PubMed:
PubMed Central:

Article history:
Received: 25.11.2021
Revision requested: 03.12.2021
Revision received: 17.12.2021
Accepted: 23.12.2021
Published: 30.12.2021

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОЙ РАНЕВОЙ ПОЛОСТИ НА БАЛИСТИЧЕСКОМ ПЛАСТИЛИНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТНЫХ И ЭКСПАНСИВНЫХ ПУЛЬ

¹Лурин И.А., ²Цема Е.В., ³Гуменюк К.В., ²Сусак Я.М., ²Дубенко Д.Е., ⁴Цема Е.Е.

¹Национальная академия медицинских наук Украины, Киев, Украина

²Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина

³Украинская военно-медицинская академия, Киев, Украина

⁴Национальный авиационный университет, Киев, Украина

hemorrhoid@ukr.net

Актуальность. Локальные вооруженные конфликты последних десятилетий по всему миру характеризуются использованием экспансивных пуль, являющихся очередным вызовом перед военными хирургами. Поэтому актуальным является проведение экспериментальных исследований, направленных на изучение баллистических свойств различных видов боеприпасов и особенностей вызванных ими поражений у раненых. Моделирование огнестрельного раневого канала является неотъемлемым этапом изучения механизма образования огнестрельных ранений и является предметом исследования раневой баллистики.

Цель: разработать экспериментальную модель для баллистической имитации пластической деформации биологических тканей, вызванную действием экспансивных и неэкспансивных пуль.

Материалы и методы. Исследования проведены на 40 блоках баллистического пластилина, в каждый из которых выполняли по одному выстрелу из огнестрельного автоматического стрелкового оружия АКС-74 и карабина ZBROYAR Z-10. В зависимости от вида боеприпасов блоки баллистического пластилина были распределены на 4 группы: группа I – 10 блоков, в которые производились выстрелы неэкспансивными военными патронами 5,45 мм с пулями «ПС» со стальным сердечником «7Н6»; группа II (10 блоков) – патроны 5,45х39 мм с экспансивными пулями «V-Max»; группа III (10 блоков) – патронами 7,62х39 мм; группа IV (10 блоков) – патроны 7,62х39 мм с экспансивными пулями типа «SP».

Результаты. Установлено, что при использовании неэкспансивных пуль наружная площадь входного шарового отверстия коррелирует с калибром снаряда (в 1,6 раза больше, чем при использовании пуль 7,62 мм). Для экспансивных пуль калибр снаряда достоверно не влияет на площадь входного отверстия ($P < 0,05$). Экспансивные свойства пули достоверно увеличивают площадь шарового отверстия в 14,87 – 31,2 раза по сравнению с неэкспансивными боеприпасами. Увеличение калибра неэкспансивных пуль приводит к значительному увеличению площади сагиттального сечения остаточной раневой полости в 1,59–2,03 раза; Экспансивные свойства пуль разных калибров оказывают разное влияние на объем остаточной раневой полости: для пуль 5,45 мм остаточная раневая полость увеличивается в 1,49 раза, для пуль 7,62 мм – уменьшается в 1,65 раза.

Выводы. Вид стрелкового оружия, калибр патрона, его экспансивные свойства оказывают влияние на пространственную конфигурацию основных баллистических показателей, возникающих в предложенной модели пластической деформации мягких тканей. Использование экспансивных пуль приводит к формированию большего объема необратимых повреждений за счет пластической деформации по сравнению с неэкспансивными аналогами.

Ключевые слова: экспансивные пули, раневая баллистика, пластическая деформация, огнестрельное ранение, раневой канал.

EXPERIMENTAL MODELING OF A RESIDUAL WOUND CAVITY ON A BALISTIC PLASTICINE USING CONVENTIONAL AND HOLLOW POINT BULLETS

¹Lurin I.A., ²Tsema Ie.V., ³Gumenuik K.V., ²Susak Ya. V., ²Dubenko D. Ye., ⁴Tsema Ye. Ie.

¹National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

²Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

³Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv, Ukraine

⁴National Aviation University, Kyiv, Ukraine

hemorrhoid@ukr.net

Relevance. Local armed conflicts of recent decades around the world are characterized by the use of hollow point (HP) bullets, which is another challenge for military surgeons. This confirms the importance for scientific research, in particular, experimental, aimed at studying the ballistic properties of various types of ammunition and the characteristics of the injuries caused by them in the wounded people. Simulation of a gunshot wound canal is an integral stage in the study of the gunshot wounds formation mechanism and is the subject of research in wound ballistics.

Objective of the work is to develop an experimental model for ballistic imitation of the plastic deformation of biological tissues caused by the action of HP and non-HP bullets.

Materials and methods. The studies were carried out on 40 blocks of ballistic plasticine, in each of which one shot was fired from an AKS-74 assault rifle and a ZBROYAR Z-10 carbine. Depending on the type of ammunition, the blocks of ballistic plasticine were divided into 4 groups: group I - 10 blocks, into which shots were made with non-HP military cartridges 5.45 mm with "PS" bullets with a steel core "7N6"; Group II (10 blocks) - 5.45x39 mm cartridges with V-Max HP bullets; group III (10 blocks) - with cartridges 7.62x39 mm; group IV (10 blocks) - cartridges 7.62x39 mm with HP bullets of the "SP" type.

Results. It was found that when using non-HP bullets, the outer area of the inlet ball hole correlates with the projectile caliber (1.6 times more than when using 7.62 mm bullets). For HP bullets, the caliber of the projectile does not significantly affect the area of the

entrance opening ($P < 0.05$). The expanding properties of the bullet significantly increase the area of the bullet hole by 14.87-31.2 times compared to non-HP ammunition. An increase in the caliber of non-HP bullets leads to a significant increase in the area of the sagittal section of the residual wound cavity by 1.59-2.03 times; The expanding properties of bullets of different calibers have a different effect on the volume of the residual wound cavity: for 5.45 mm bullets, the residual wound cavity increases 1.49 times, for 7.62 mm bullets it decreases 1.65 times.

Conclusions. The type of small arms, the caliber of the cartridge, its expanding properties affect the spatial configuration of the main ballistic indicators arising in the proposed model of plastic deformation of soft tissues. The use of HP bullets leads to the formation of a larger volume of irreversible damage due to plastic deformation in comparison with non-HP analogs.

Key words: hollow point (HP) bullets, wound ballistics, plastic deformation, gunshot wound, wound canal.